(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3750945号
(P3750945)

(45) 発行日 平成18年3月1日(2006.3.1)

(24) 登録日 平成17年12月16日(2005.12.16)

(51) Int. Cl.	F I	
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	C 1 2 N 15/00	Z N A A
C O 7 K 14/82 (2006.01)	C O 7 K 14/82	
C O 7 K 16/32 (2006.01)	C O 7 K 16/32	
C 1 2 Q 1/02 (2006.01)	C 1 2 Q 1/02	
G O 1 N 33/53 (2006.01)	G O 1 N 33/53	D
請求項の数 22 (全 46 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2003-584305 (P2003-584305)	(73) 特許権者	599045903
(86) (22) 出願日	平成15年4月14日(2003.4.14)		学校法人 久留米大学
(86) 国際出願番号	PCT/JP2003/004699		福岡県久留米市旭町67番地
(87) 国際公開番号	W02003/087363	(74) 代理人	100080791
(87) 国際公開日	平成15年10月23日(2003.10.23)		弁理士 高島 一
審査請求日	平成17年5月11日(2005.5.11)	(72) 発明者	常岡 誠
(31) 優先権主張番号	特願2002-111377 (P2002-111377)		福岡県久留米市南薫西町2024
(32) 優先日	平成14年4月12日(2002.4.12)	(72) 発明者	木村 博司
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		福岡県久留米市小頭町11-3-902
早期審査対象出願		審査官	左海 匡子
最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】 がん関連遺伝子 m i n a 5 3、タンパク質 M i n a 5 3 およびそのモノクローナル抗体

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

配列番号1で示される塩基配列を有するヒトがん関連遺伝子 m i n a 5 3 を含有してなるがんの診断マーカー。

【請求項2】

配列番号2で示される塩基配列を有するマウスがん関連遺伝子 m i n a 5 3 。

【請求項3】

配列番号3で示される塩基配列を有するラットがん関連遺伝子 m i n a 5 3 。

【請求項4】

配列番号1で示されるアミノ酸配列を有するヒトタンパク質 M i n a 5 3 を含有してなるがんの診断マーカー。

【請求項5】

配列番号2で示されるアミノ酸配列を有する、細胞増殖作用を有するマウスタンパク質 M i n a 5 3 。

【請求項6】

配列番号3で示されるアミノ酸配列を有する、細胞増殖作用を有するラットタンパク質 M i n a 5 3 。

【請求項7】

請求項2または3に記載のがん関連遺伝子 m i n a 5 3 を含有していることを特徴とするベクター。

10

【請求項 8】

請求項 7 に記載するベクターを含有する形質転換体。

【請求項 9】

配列番号 1 で示される塩基配列からなるヌクレオチドに対応する mRNA に特異的に作用する、21ヌクレオチドからなる siRNA を含有してなる細胞増殖抑制剤。

【請求項 10】

配列番号 1 で示されるアミノ酸配列からなるペプチドまたはその一部に対する抗体を含有する、がんの検出試薬。

【請求項 11】

抗体がモノクローナル抗体である請求項 10 に記載の検出試薬。

10

【請求項 12】

請求項 11 に記載する検出試薬に含まれるモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ。

【請求項 13】

ハイブリドーマが F E R M P - 1 9 2 9 8 である請求項 12 に記載するハイブリドーマ。

【請求項 14】

請求項 5 に記載するマウスタンパク質 M i n a 5 3 を特異的に認識する抗体。

【請求項 15】

請求項 6 に記載するラットタンパク質 M i n a 5 3 を特異的に認識する抗体。

20

【請求項 16】

請求項 11 に記載するモノクローナル抗体を用いてタンパク質 M i n a 5 3 をがん細胞またはがん組織中に検出することを特徴とするタンパク質 M i n a 5 3 の検出方法。

【請求項 17】

前記がんが大腸がんまたは食道がんである、請求項 16 に記載するタンパク質 M i n a 5 3 の検出方法。

【請求項 18】

請求項 16 または 17 に記載するタンパク質 M i n a 5 3 の検出方法によってがんを識別することを特徴とするがんの識別方法。

【請求項 19】

前記がんが大腸がんまたは食道がんである、請求項 18 に記載するがんの識別方法。

30

【請求項 20】

がんの予後を識別することを特徴とする、請求項 18 または 19 に記載する識別方法。

【請求項 21】

配列番号 1 で示される塩基配列からなる核酸またはそのフラグメントを含有してなるがんの検出試薬。

【請求項 22】

請求項 21 に記載するがんの検出試薬を用いて mRNA を検出することを特徴とするがんの識別方法。

【発明の詳細な説明】

40

技術分野

この発明は、がん関連遺伝子 m i n a 5 3、タンパク質 M i n a 5 3 およびそのモノクローナル抗体に関する。

背景技術

がんは、致命的な自然経過をたどる細胞性腫瘍であり、ヒトの死亡原因の大きな割合を占めていて、それも増加する傾向がある。がん細胞は、元来は正常細胞であり、その正常細胞の遺伝子が、例えば、化学物質や放射線、またはウイルスの感染などの何らかの原因によって、その遺伝子の DNA が傷つき、修復されずに蓄積されると、その正常細胞ががん化すると考えられている。細胞には、傷ついた遺伝子を修復する機構が備わっているが、この仕組みが正常に機能しなければ、異常な遺伝子が蓄積することになる。がんに関係す

50

る遺伝子も数多く見つかっていて、かかる遺伝子の中には、がんを促進するがん遺伝子と、がんを抑制するがん抑制遺伝子とがある。

かかるがん関連遺伝の1つのファミリーである前がん遺伝子*myc*ファミリーは、特にがんとの関連が古くから知られていて、がんや、個体発生などにおいて重要な役割を果たしている細胞増殖関連の遺伝子であり、この遺伝子の異常がヒトがんにおいて非常に高い割合で見つまっている。

このがん遺伝子*c-myc*ファミリーは、主に3つの遺伝子、*c-myc*と、*N-myc*と、*L-myc*とから構成されているが、これら3つの遺伝子は、発現する場所とタイミングは異なっているが、基本的には同じ生物学的活性を持つと考えられている。このがん遺伝子*c-myc*の発現は、転写レベルと転写後レベルなどのレベルで高度に調節されている。一般的には、*c-myc*の発現は、細胞増殖に関連していて、静止期にある細胞あるいは分化細胞中においてその発現が低下する。遺伝子増殖、ウイルスプロモーター挿入、染色体の転座もしくはプロモーター突然変異などによって、*myc*ファミリー遺伝子が脱調節されて異常に発現することは、ヒトなどの広い範囲の脊椎動物における新形成疾患（いわゆる腫瘍形成等）に関連している（DePinho, R.A., et al.: (1991) *Adv. Cancer Res.* 57, 1-46; Marcu, K.B., et al.: (1992) *Annu. Rev. Biochem.* 61, 809-860; Morgenbesser, S.D., et al.: (1994) *Semin. Cancer Biol.* 5, 21-36; Henriksson, M., et al.: (1996) *Adv. Cancer Res.* 68, 109-182; Grandori, C., et al.: (2000) *Annu. Rev. Cell. Dev. Biol.* 16, 653-99）。*c-myc*もしくは*N-myc*をノックアウトしたマウス胎児は、胚発生中期の間に多臓器発育不全を誘発し死亡する（Stanton, B.R., et al.: (1992) *Genes Dev.* 6, 2235-2247; Sawai, S., et al.: (1993) *Development* 117, 1445-1455; Davis, A.C., et al.: (1993) *Genes Dev.* 7, 671-682）。これらの結果は、*myc*が細胞発育の中心的調節因子であることを示している（Henriksson, M., Luscher, B.: (1996) *Adv. Cancer Res.* 68, 109-182; Grandori, C., et al.: (2000) *Annu. Rev. Cell. Dev. Biol.* 16, 653-99; Luscher, B.: (2001) *Gene* 277, 1-14）。

このがん遺伝子*myc*ファミリーの遺伝子は、種々の遺伝子の発現を調節する転写因子（*Myc*タンパク質）をコードしている（Grandori, C., et al.: (2000) *Annu. Rev. Cell. Dev. Biol.* 16, 653-99; Luscher, B.: (2001) *Gene* 277(Oct 17; (1-2):), 1-14）。*myc*ファミリー遺伝子がコードしているタンパク質は、ベーシック-ヘリックス-ループ-ヘリックス-ロイジンジッパー（bHLHLZ）クラスの転写因子の1員である。*Myc*タンパク質とその必須相手の*Max*との2量体は、配列特異的DNA結合活性を有するヘテロ2量体を形成する。この2量体は、ベーシック部分を介してE-ボックス部位（主にCACGTGエレメント）に結合する。*myc*にはその他に転写活性化（transactivation）ドメインがあり、これらのドメインの働きを通して遺伝子の転写を活性化する。例えば、ODC（Bello-Fernandez, C., et al.: (1993) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 90, 7804-7808）、cdc25A（Galaktionov, K., et al.: (1996) *Nature* 382, 511-517）、RCC1（Tsuneoka, M., et al.: (1997) *Oncogene* 14, 2301-2311）、cyclin D2（Bouchard, C., et al.: (2000) *Genes & Dev* 15, 2042-2047）、Id2（Lasorella, A., et al.: (2000) *Nature* 407, 592-598）などの*Myc*標的遺伝子が同定されている（Dang, C.V.: (1999) *Mol. Cell. Biol.* 1-11）。機能を持つ*c-myc*遺伝子を完全に欠損した細胞に、発現遺伝子ライブラリーを導入して正常な増殖を再確立する遺伝子を同定しようとしても、*c-myc*ならびに*N-myc*が繰り返えされるだけで別の遺伝子は同定することができなかった。これらの結果は、*myc*が単一の遺伝子ではなく複数の遺伝子を制御して細胞増殖を調節していることを示唆している。しかし、がん遺伝子*myc*の機能を解明するのに十分な*Myc*標的遺伝子が未だ同定されておらず、*myc*の機能発揮のメカニズムは十分には明らかにされていない。従って、*myc*によって発現調節される新規な遺伝子を同定することは、がん遺伝子*myc*の機能を解明するのに役立つ。

がんのうちでも、大腸がんは、西洋において最も頻繁に発生している。現在では、ある種の大腸がんは全く新しく発生するけれども、ほとんどの大腸がんは既存の腺腫から発生するものと考えられている（Fearon, E.R., Vogelstein, B.: *Cell* 1990, 61:759-767; Kuramoto, S., Oohara, T.: *Cancer* 1989, 64:950-955; Bedenne, L., et al.: *Cancer* 1992, 69:883-888; Wad

10

20

30

40

50

a, R., et al.: *Cancer* 1996, 77:44-50)。すなわち、ほとんどの大腸がんは、正常状態から前がん状態（腺腫）、がん状態へという一連の組織学的変化を徐々にしながら発生することが知られている（Fearon, E. R., Vogelstein, B.: *ibid.*; Vogelstein, B., Kinzler, K. W.: *Trends Genet* 1993, 9:138-141; Kinzler, K. W., Vogelstein, B.: *Cell*, 1996, 87:159-170)。がんが進行する過程では、一般的には、あまり分化していない（以下、「低分化」ともいう）腫瘍が、中程度に分化した（以下、「中分化」ともいう）腫瘍もしくはそれ以上分化した、つまり高度に分化した（以下「高分化」ともいう）腫瘍よりも速い速度で進行するものと考えられている。

大腸がんに関連した遺伝子を解明する研究によって、腫瘍抑制遺伝子の機能損失ならびに腫瘍遺伝子の活性化や発現異常が発がんに関与していることが示されている。前がん遺伝子 *myc* ファミリー *c-myc* は、ヒト大腸がんのほとんどで過剰発現されるとの報告があり（Stewart, J., et al.: *Br J Cancer* 1986, 53:1-6; Sikora, K., et al.: *Cancer* 1987, 59:1289-1295）、そのほとんどが腫瘍抑制遺伝子 *APC* 遺伝子突然変異を有していると報告されている（Cottrell, S., et al.: *Lancet* 1992, 340:626-630; Miyoshi, Y., et al.: *Hum Mol Genet* 1992, 1:229-233; Powell, S. M., et al.: *Nature* 1992, 359:235-237）。

近年、*APC* 経路の標的として *c-myc* が特定され、大腸がんにおいて *c-myc* を過剰発現する機構を理解するための分子フレームワークが提供されている（He, T. C., et al.: *Science* 1998, 281:1509-1512）。*c-myc* 発現が *APC* 遺伝子の機能損失によって惹起されたりまたは機能的な *APC* 遺伝子産物によって抑制されたりすることはこのフレームワークを指示している。

大腸がん発生における *c-myc* の役割が鋭意調べられているけれども、*c-myc* 遺伝子の異常発現が発がんに関与する機構は未だ十分には解明されてなく、多くの側面が未だ謎のままである（Lutz W., et al.: *Biochim Biophys Acta* 2002, 1602:61-71）。*c-myc* 遺伝子は、多機能性遺伝子であり、細胞分裂、細胞生育、アポトーシスなどの機能に関連している。*c-myc* 遺伝子はまたいくつかの遺伝子の発現を調節するとともに、そのいくつかは発がんに関連している上記機能を仲介する働きをしている。したがって、*c-myc* 遺伝子によって調節される新規遺伝子の機能的情報ならびに発現パターンを解析することは、*c-myc* 遺伝子によって生じられる大腸がんをより一層理解することに役立つものと考えられる。

大腸がんに加えて、我が国では食道がんも多いがんのひとつである。その患者数は加齢と共に急激に増加する。現在では、食道がんでは亡くなる患者数はがんで亡くなる総患者数の約3%に達している。これから迎える高年齢化社会において食道がんが更に増えることが危惧され、食道がんも国民の健康を考える上で重要な病気である。

食道がんに関連した遺伝子を解明する研究によって、腫瘍抑制遺伝子の機能損失ならびに腫瘍遺伝子の活性化や発現異常が発がんに関与していることが示されているが、*c-myc* もその発現異常が報告されている（Kennedy AR: *Cancer Res.* 1994, 54(7 Suppl):1999s-2005s）。

本発明者らは *c-myc* によって発現が上昇する遺伝子を cDNA マイクロアレイによって探索した。その結果、本特許事項で扱っている新規がん関連遺伝子を同定した。*c-Myc* 蛋白質はこの遺伝子の発現を調節するプロモーター部分に結合し、この遺伝子の発現を直接上昇することがわかった（Tsuneoka, M., et al.: *J Biol Chem* 2002, 277:35450-35459）。白血病細胞株 HL 60 は TPA（ホルボール 2 - ミリスレート 13 - アセテート（phorbol 2-myristate 13-acetate））で処理することにより、*c-myc* 発現が減少し増殖しなくなることが分かっている。そこで、未処理あるいは、TPA で処理した白血病細胞株 HL 60 の細胞抽出液を、かかるがん関連遺伝子がコードするタンパク質に特異性を有するポリクローナル抗体を作製し検討したところ、このタンパク質の発現が TPA により減少することがわかった（Tsuneoka, M., et al.: *J Biol Chem* 2002, 277:35450-35459）。

なお、このタンパク質は、後で説明するように、特異的な抗体で間接免疫蛍光染色することによって可視化したところ、細胞内の核中に局在していることが見出されたことから、

10

20

30

40

50

分子量 53 kDa を有する myc-induced nuclear antigen に因んで、このタンパク質を M i n a 5 3 と命名するとともに、この遺伝子を m i n a 5 3 と指称する。

したがって、上記先行技術による知見に基づいて、タンパク質 M i n a 5 3 に対する抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を利用して、c - m y c 遺伝子によって調節されるこのがん関連遺伝子 m i n a 5 3 ならびにそのタンパク質 M i n a 5 3 の機能的情報ならびに発現パターンを調べることは、c - m y c 遺伝子による発がん機構を解明するのに大いに役立つものと、本発明者らは考えている。

そこで、本発明者は、がん遺伝子 m y c の機能を説明するために、M y c 標的遺伝子を同定すべく鋭意検討・研究した結果、そのタンパク質 M i n a 5 3 に対する抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体（以下、「抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体」ともいう）を作製することに成功した。また、本発明者は、その抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を利用して、正常な大腸組織に比べて、大腸がん細胞においてタンパク質 M i n a 5 3 の発現が増加することを見出すとともに、このタンパク質 M i n a 5 3 の発現が、大腸がんにおける初期事象であり、特異的な特性であることを示した。更に、M i n a 5 3 が大腸がん発生においてある種の役割を果たしている蓋然性を示唆していることも見出した。これらの結果から、ヒトタンパク質 M i n a 5 3 が、特に大腸がんに対するマーカーとして使用することができ、かつ大腸がん疾患を処置するための標的として開発できる可能性があることを見出した。さらに、食道がんに対してもマーカーとして使用することができ、かつ食道がん疾患を処置するための標的として開発できる可能性があることを見出してこの発明を完成した。

発明の開示

この発明は、がん遺伝子 m y c の機能を説明することができる M y c 標的遺伝子であるヒト、マウスならびにラット m i n a 5 3 遺伝子およびヒト、マウスならびにラットのタンパク質 M i n a 5 3 を提供することを目的としている。

この発明は、m i n a 5 3 遺伝子をコードしているプラスミドならびにレポータープラスミドを提供することを別の目的としている。

この発明の更に別の目的は、かかる新規な M y c 標的遺伝子によってがん細胞の増殖抑制をする方法を提供することである。

また、この発明は、m i n a 5 3 遺伝子またはヒトタンパク質 M i n a 5 3 もしくはそのフラグメントを抗原として得られる抗体を提供することを更に別の目的としている。

更に、この発明は、タンパク質 M i n a 5 3 に対して特異性を有するモノクローナル抗体（以下、「抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体」ともいう）を提供することを目的としている。

この発明のまた別の目的は、抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いてタンパク質 M i n a 5 3 をがん細胞またはがん組織中で検出することからなるタンパク質 M i n a 5 3 の検出方法を提供することである。

この発明は、抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いて、がん細胞またはがん組織中に発現したタンパク質 M i n a 5 3 を染色することからなるタンパク質 M i n a 5 3 の染色方法を提供することを更に別の目的としている。

それらに加えて、この発明は、抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いて、がん細胞またはがん組織中に発現したタンパク質 M i n a 5 3 を染色することによってがんを診断することからなるがんの診断方法を提供することを別の目的としている。

これらの上記目的を達成するために、この発明は、新規な M y c 標的遺伝子であるがん関連遺伝子を提供する。

この発明の態様の 1 つとして、この発明は、がん遺伝子 m y c によって直接発現調節を受けるとともに、配列表の配列番号 1 に示す塩基配列ならびにアミノ酸配列を有し、かつ、分子量 5 万 3 千 (5 3 k D a) の核タンパク質をコードしているがん関連遺伝子 m i n a 5 3 を提供する。また、この発明は、その 1 つの好ましい態様として、がん細胞の増殖に関連して、かつ、がん組織において特異的に発現が上昇するがん関連遺伝子 m i n a 5 3 を提供する。この発明の別の好ましい態様として、分子量 5 3 k D a を有するタンパ

10

20

30

40

50

ク質をコードしているがん関連遺伝子 *mina53* が提供される。更に、この発明は、その好ましい別の態様として、核酸および核小体に局在していて、かつ、その発現が *c-myc* 遺伝子によって誘発されるところのがん関連遺伝子 *mina53* を提供している。更に、この発明は、配列番号 1 で示されるアミノ酸配列を有する細胞増殖作用を有するヒトタンパク質 *Mina53* を提供する。

したがって、これらの諸機能を利用して、この発明に係る *mina53* 遺伝子ならびにそのタンパク質である *Mina53* タンパク質は後述するように様々な有用な応用ができる。

この発明はまた、配列番号 2 で示される塩基配列を有するマウスがん関連遺伝子 *mina53* または配列番号 3 で示される塩基配列を有するラットがん関連遺伝子 *mina53* を提供する。この発明による配列番号 2 で示される塩基配列を有するマウスがん関連遺伝子 *mina53* および配列番号 3 で示される塩基配列を有するラットがん関連遺伝子 *mina53* は、その細胞増殖作用を調べるのに有用である。

この発明の別の態様として、この発明に係るがん関連遺伝子 *mina53* をコードしているプラスミドが提供される。この発明はまた、その更に別の態様として、*mina53* ゲノミック DNA フラグメントを有するレポータープラスミドを提供している。

また、この発明は、その更に別の態様として、がん関連遺伝子 *mina53* の発現を調節する方法を提供している。

更に、この発明の別の態様として、*Mina53* タンパク質に対する抗体が提供される。この発明に係る抗体は、例えば、がんの診断やがんの治療に利用することができるとともに、がん細胞などの正常でない細胞の診断や、細胞の状態の診断などにも利用することができる。

つまり、この発明は、タンパク質 *Mina53*、特にヒトタンパク質 *Mina53* に対して特異性を有する抗 *Mina53* モノクローナル抗体を提供している。

この発明はまた、その更に別の態様として、抗 *Mina53* モノクローナル抗体を用いてタンパク質 *Mina53* をがん細胞またはがん組織中に検出することからなるタンパク質 *Mina53* の検出方法 (を) 提供している。

この発明のより好ましい態様として、タンパク質 *Mina53* を、大腸がん細胞または大腸がん組織中に検出することからなるタンパク質 *Mina53* の検出方法が提供される。

また、この発明は、その更に別の態様として、抗 *Mina53* モノクローナル抗体を用いて、がん細胞またはがん組織中に発現したタンパク質 *Mina53* を染色することからなるタンパク質 *Mina53* の染色方法を提供する。更に、この発明は、より好ましい態様として、抗 *Mina53* モノクローナル抗体を用いて、大腸がん細胞または大腸がん組織中、食道がん細胞または食道がん組織中に発現したタンパク質 *Mina53* を染色するタンパク質 *Mina53* の染色方法を提供している。

この発明の更に別の態様として、この発明は、抗 *Mina53* モノクローナル抗体を用いて、がん細胞またはがん組織中に発現したタンパク質 *Mina53* を染色することによってがんを診断することからなるがんの診断方法を提供している。この発明はまた、その好ましい態様として、抗 *Mina53* モノクローナル抗体を用いてタンパク質 *Mina53* を染色することによって大腸がん、食道がんの診断をする方法を提供している。

この発明のその他の目的、特長ならびに利点は、本明細書の下記の記載から明白となるものと理解できる。

【図面の簡単な説明】

図 1 は、この発明に係るヒト *mina53* 遺伝子の構造を示す図である。図 1 A はヒト *mina53* 遺伝子のゲノミック構成を示す図であり、図 1 B はレポータープラスミドを示す図であり、図 1 C は T98Gmycer-2 細胞を使用したトランジェント発現アッセイの結果を示す図である。

図 2 は *mina53* mRNA の発現レベルを示す図である。図 2 A は *mina53* mRNA の発現レベルが T98G 細胞中の *c-myc* 発現レベルと関連していることを示す図であり、図 2 B はヒト前骨髄性白血病 HL60 細胞における *mina53* mRNA の発現レ

10

20

30

40

50

ベルの低下と *c - myc* mRNA の消滅との関係を示す図であり、図 2 C は *My c E R* タンパク質を発現する T 9 8 G 細胞 (T98Gmycer-2 細胞) における *mi n a 5 3* mRNA の発現誘導を示す図である。

図 3 は *M i n a 5 3* のウエスタンブロットリング分析結果を示す図である。図 3 A 左は *My c* の活性化による *M i n a 5 3* タンパク質の発現上昇を説明する図であり、図 3 A 右は T P A により *My c* 発現を減少させたときの *c - My c* タンパク質および *M i n a 5 3* タンパク質の発現減少を説明する図であり、図 3 B はラット細胞にヒト *c - My c* あるいは遺伝子発現上昇能を失った変異体 *c - My c* を発現させたときの *M i n a 5 3* タンパク質の発現変化 (*My c* による発現上昇) を示す図である。

図 4 は H L 6 0 細胞を使用したクロマチン免疫沈降実験結果を示す図である。

10

図 5 は R N A 干渉による *M i n a 5 3* タンパク質発現の減少とその細胞増殖に及ぼす効果を示す図である。図 5 A は R N A 干渉による *M i n a 5 3* タンパク質発現の減少を示す図であり、図 5 B は R N A 干渉により *M i n a 5 3* タンパク質発現が減少した細胞の細胞増殖を示す図である。図中、黒丸印はヒト *mi n a 5 3* に特異的な *s i R N A* 二本鎖を導入した細胞の様子を示す。黒三角印はラット *mi n a 5 3* に特異的な *s i R N A* 二本鎖を導入した細胞の様子を示す。白丸印はコントロール *s i R N A* 二本鎖を導入した細胞の様子を示す。

図 6 A は、抗 *M i n a 5 3* モノクローナル抗体を用いたタンパク質 *M i n a 5 3* のウエスタンブロットリング分析結果を示す図であり、図 6 B は細胞内局在の状態を示す図である。図 7 は、大腸がん組織におけるタンパク質 *M i n a 5 3* と *K i - 6 7* との免疫組織化学的染色血かを示す図である。図 7 A は中分化腫瘍を含む切片の H E 染色を示す図である。図 7 B は、図 7 A での連続切片を示す図であり、抗 *M i n a 5 3* モノクローナル抗体によって染色することにより、がん領域における *M i n a 5 3* の発現上昇を示している。また、隣接非腫瘍組織はほとんど染色されなかったことを示している。図 7 C は抗 *K i - 6 7* 抗体によって染色した図 7 A での連続切片を示す図である。図 7 D は一次抗体を使用していない図 7 A におけるコントロールとしての切片を示す図である。図 7 E は *M i n a 5 3* の特徴的核局在を示している図 7 B に示す切片の拡大図である。図 7 F は抗 *M i n a 5 3* モノクローナル抗体による低分化腫瘍の染色を示す図である。図中、スケールは、 $300\mu\text{m}$ (図 7 A - D)、 $50\mu\text{m}$ (図 7 E) および $75\mu\text{m}$ (図 7 F) である。

20

図 8 は、浸潤および転移している腫瘍における *M i n a 5 3* の免疫組織化学的発現を示す図である。図 8 A は、抗 *M i n a 5 3* モノクローナル抗体によって染色した上皮下のリンパ管に侵入したがん細胞を示している。図 8 B は、抗 *M i n a 5 3* モノクローナル抗体で染色した大腸深層にあるリンパ管中のがん細胞を示している。図 8 C は深部に浸潤している腫瘍細胞を染色した図である。図 8 D は、抗 *M i n a 5 3* モノクローナル抗体によって染色した繊維性基質中の腫瘍細胞を示している。スケールは、 $75\mu\text{m}$ (図 8 A および図 8 D)、 $150\mu\text{m}$ (図 8 B)、 $300\mu\text{m}$ (図 8 C) である。

30

図 9 は、がん性、腺腫様ならびに非腫瘍性大腸組織の連続切片を抗 *M i n a 5 3* モノクローナル抗体 (左側) と抗 *K i - 6 7* クロナル抗体 (右側) で染色した場合の染色パターンの比較を示す図である。図 9 A は、高分化腫瘍における *M i n a 5 3* の染色を *K i - 6 7* の染色 (図 9 B) と比較した図を示す。図 9 C は、腺腫における *M i n a 5 3* の染色を、*K i - 6 7* を染色した図 9 D と比較した図を示す。図 9 E は、正常腺窩における上皮細胞の *M i n a 5 3* に対する染色を、*K i - 6 7* を染色した図 9 F と比較した図を示す。図 9 G は、リンパ濾胞の胚中心における *M i n a 5 3* の染色を、*K i - 6 7* を染色した図 9 H と比較した図を示す。スケールは、 $75\mu\text{m}$ (図 9 A - F) と、 $150\mu\text{m}$ (図 9 G と図 9 H) である。

40

図 1 0 は、リコンビナントタンパク質 *M i n a 5 3* の定量線を示すグラフである。

図 1 1 は、ヒト血液中のタンパク質 *M i n a 5 3* の定量を示すグラフである。

図 1 2 は、*M i n a 5 3* または *K i - 6 7* の発現と累積生存率を示すグラフである。(A) は *M i n a 5 3* の発現と累積生存率との関係を示し、(B) は *K i - 6 7* の発現と累積生存率との関係を示す。

50

図13は、食道がん組織に対するMina53とKi-67との発現度合いの比較を示すプロット図である。

発明を実施するための最良の形態

この発明に係るがん関連遺伝子mina53のcDNA配列を含むヒトゲノミックDNA配列はHTGS (GenBankAcc:AC026100,AC073245,AC024892)で検索することができる。

なお、イントロン2(エクソン2とエクソン3との間)の長さはGenBankのデータ中で異なっているので、エクソン2とエクソン3の配列に対応するオリゴヌクレオチドをプライマーとして用いてPCRで増幅し、その長さを5.2kbであることを決定した。この発明に係るがん関連遺伝子mina53は配列表の配列番号1で示される塩基配列ならびにアミノ酸配列を有する。更に詳細には、図1に示すように、この発明のがん関連遺伝子mina53のうち、ヒトmina53遺伝子は12個のエクソンから構成され、最上流側に2個のエクソン1aとエクソン1bとは2個の転写開始部位として存在し、エクソン2に翻訳開始部位が存在するとともに、最後のエクソン10に停止コドン(TAG)が存在している。また、エクソン1bは、エクソン1aの0.25kb下流に存在する。更に、主cDNAの中央部、すなわちエクソン5とエクソン6との間に挿入された101bpの配列がエクソン5'として存在しているcDNAもある。464個のアミノ酸(297Qを欠失している)をコードするcDNAは、エクソン7の最初の3bpを欠失している。UCSCGenomeBrowserのマッピングデータは、mina53遺伝子が第3番染色体(3q12.1)にマップされている。

また、この発明に係るがん関連遺伝子mina53は、その発現ががん遺伝子c-mycによって直接誘発され、また分子量53kDaを有するタンパク質をコードしていて、そのタンパク質は核質および核小体に存在している。更に、mina53の発現を特異的に阻害すると、細胞増殖が著しく抑制される。

この発明に係る新規な遺伝子mina53はcDNAマイクロアレイ手法を使用して同定することができる。使用できるcDNAマイクロアレイ法としては、DNAチップ(cDNAマイクロアレイ)などの当該技術分野において慣用されている種々の手法を使用することができる。例えば、未処理のT98Gmycer-2細胞(後述する)と、エストロゲンの誘導体4-ヒドロキシタモキシフェン(OHT)で20時間処理した同細胞から全RNAを単離することができる。ポリ(A+)RNAは回収し、市販のDNAチップを用いて示差ディスプレイに付することができる。DNAチップには、発現配列タグ(EST: Expression Sequence Tagged)クローンを含む約9千種類もしくはそれ以上のcDNAをプレートすることができる。当然ながら、この発明はかかる技術に一切限定されるものではなく、当該技術において使用できる技術であればいずれの技術であっても使用することができる。

この発明において使用するc-mycをコードするプラスミドは、当該分野においては慣用されている手法によって作製することができる。使用するプラスミドにしても種々のプラスミドが市販されていて、目的に応じて適宜選択することができる。この発明において使用するc-mycをコードするプラスミドとしては、例えば、ヒトc-mycをCMVプロモーターによって発現誘導するPc-myc/CDM8(Tsuneoka, M. et al. (1997) Oncogene 14, 2301-2311)あるいはそれを、PstIで消化し、自己ライゲートして作製された活性化ドメインが欠如している変異型c-Mycタンパク質をコードするpc-myc(d41-178)/CDM8, pTc-mycer/BSのBstXI-KpnIフラグメントを、pCAGGS哺乳動物発現ベクターのEcoRIフラグメント中に挿入し、c-mycerをチキン-アクチンとCMVプロモーターとから構成されたキメラプロモーター下に挿入して作製されたpc-mycer/CAGGSなどを使用することができる。

この発明に係るmina53をコードするプラスミドも同様に当該分野においては慣用されている手法によって作製することができる。使用するプラスミドにしても同様に種々のプラスミドが市販されていて、目的に応じて適宜選択することができる。

例えば、ヒトmina53に対するcDNAを、ヒト赤血球白血病細胞(HEL)ライブラリーからの5'-G A A G C T T A T G C C A A A G A A A G C A A A G C C T A C A

10

20

30

40

50

GG-3' (開始コドンのメチオニンの直前にHindIII部位を追加)と、5'-TGAA
 TTCATCCTCTCTCTCGGCTCAGGTCCTT-3'をプライマーとして使用
 してPCRによって増幅し、増幅したフラグメントを特定のベクター中にクローン化して
 、それぞれ465個ならびに464個のアミノ酸からなるタンパク質をコードするpT/hmi
 na53(465)ならびにpT/hmina53(464)とを作製することができる。このpT/hmina53(46
 5)のHindIII-SalIフラグメントからpEGFP/hmina53(465)(GFP-Mina53融合タンパク質
 を合成する)を作製することができる。また、HindIIIとNotIとで消化したpT/hmina53(4
 65)のHindIII-NotIフラグメントからphmina53/Rc/CMVを作製することができる。更に、
 ヒトmina53をコードするDNAフラグメントを、pEGFP/hmina53(465)からの5
 -GCCATGCCATGGCAAGAAGCAAGCCTAC-3 (NcoI部位
 を追加)と、5-GGCATGCCATGGCTAGACTACTTGAATTAAC-3 (NcoI部位
 を追加)とをプライマーとして用いてPCRで増幅し、増幅したフラ
 グメントを、NcoIで消化したE.coli発現ベクター-pETに挿入して、pET/hmina53を作製する
 ことができる。更に、pEGFP/hmina53(465)のxhoI-SalIフラグメントをベクター)中に
 挿入して、pGEX-hmina53(GST-Mina53融合タンパク質)を作製することもできる。

また、この発明では、mina53遺伝子のプロモータ活性を調べるために、その特定部
 位を含むヒトmina53ゲノミックDNAフラグメントをルシフェラーズ(luciferase
)cDNAに結合して、常法によりレポータープラスミドを構築することができる。DN
 Aフラグメントがプロモータ活性を有していることはT98G細胞中でのトランジェント
 発現アッセイによって調べることができる。

この発明によって、c-Mycがmina53の発現を直接調節していることは明らかで
 ある。血清飢餓状態におかれたT98G細胞が血清で活性化されたとき、c-mycmR
 NAのレベルが上昇し、その後続いてmina53が上昇する。HL60細胞中でTPA
 によるc-mycの発現が低下すると、mina53mRNAならびにタンパク質の発現
 も低下する。ラット繊維芽細胞株3Y1中で、転写活性化ドメインを欠損した変異型c-
 Mycではなく、野生型c-Mycが高発現すると、mina53の発現が上昇する。c
 -Mycタンパク質がc-MycERキメラタンパク質中で活性化されたときに、min
 a53mRNAとタンパク質の発現が活性化される。c-MycERの活性化によるmin
 a53mRNAの誘導はタンパク質合成インヒビターであるシクロヘキサミドの存在下
 でも維持される。トランジェント発現アッセイにおいて、ヒトmina53ゲノミックD
 NAフラグメントから構築されたレポータープラスミドからの発現は、c-MycERの
 活性化によって上昇した。レポータープラスミド中の予測Myc結合部位(E-ボックス
 1: CACGTGエレメント)が破壊されたときには、c-mycによるレポーター遺伝
 子発現の刺激上昇は起こらない。一方のCACGTGエレメント(E-ボックス1)が突
 然変異してもほとんど効果を有していないのに対して、他方のCACGTGエレメント(
 E-ボックス2)が突然変異するとc-Mycによるプロモーター活性上昇が著しく低下
 することは、c-Mycが特異的なCACGTGエレメントを介してmina53の発現
 を活性化させることを示唆している。c-Mycタンパク質は、増殖期のHL60におい
 て、インビボでmina53遺伝子の上記CACGTGエレメントが存在するmina5
 3ゲノミックDNAに結合する。ただし、TPAによって処理されたHL60細胞では、
 c-Mycタンパク質は、mina53ゲノミックDNAに結合しない。これらの結果は
 c-Mycがmina53の発現を直接誘発していることを示している。

この発明に係る新規遺伝子mina53は細胞増殖の調節を行う機能を有している。ヒト
 と嚙歯動物との間にMina53のアミノ酸配列が高率に保存されていることは、このタ
 ンパク質が哺乳動物において重要な役割を果たしていることを示唆している。mina5
 3の発現は細胞増殖と深く関係していて、細胞増殖に対するmina53の役割を示して
 いる。Mina53の生物学的機能を調べるために、新しい手法、つまりスモール・イン
 ターフェアランスRNA(sRNA)手法を、mina53の発現を特異的に阻止する
 ために適用したところ、ヒトならびにラットの細胞中でMina53タンパク質の発現が
 ヒトならびにラットmina53各々に特異的なsRNA二本鎖によってだけ特異的に

10

20

30

40

50

減少することによって特異的な阻害が明白に示された。他方、M i n a 5 3 タンパク質の発現は、コントロール s i R N A (ヒト m i n a 5 3 に対する反転配列) または使用した細胞とは異なる動物の m i n a 5 3 に対する二本鎖によっては、特異的に減少しなかった。M i n a 5 3 タンパク質の発現が減少したとき、細胞増殖が著しく阻害されることが、ヒトならびにラットの細胞において観察された。これらの結果は哺乳動物の細胞増殖における m i n a 5 3 の重要性を示している。

c - m y c 遺伝子の発現を段階的にゼロまで低下させたマウスを使用したインビボでの研究によって、c - m y c 遺伝子は、その c - M y c レベルが低下すると多臓器形成不全 (細胞数を減少する) による体重低下を引き起こすという働きを有していることが示されている。M y c 活性は、マウスにおける細胞周期を再開する活性化 T 細胞と繊維芽細胞の細胞分裂する細胞との割合を決定する。最近のタイム - ラプス (time-lapse) 顕微鏡によるインビボでの研究によっても、m y c 遺伝子は、細胞分裂を調節して、細胞周期に入るかもしくは細胞周期から出るかを調節していることが示されている。また、細胞周期の進行に直接関与しているいくつかの遺伝子、例えば、サイクリン D 1、サイクリン D 2、I d 2 などが M y c 標的遺伝子として同定され、これらと一致した結果を示している。これらの遺伝子の一つを欠失したマウスは、c - m y c を欠失したマウスと比較して、より緩やかな結果を示すのに対して、その機能を有する c - m y c 遺伝子を完全に欠損した細胞に、発現遺伝子ライブラリーを導入しても、c - m y c と N - m y c とを繰り返し同定するだけで、正常な増殖を再確立する遺伝子を同定することはできなかった。これらの結果は、m y c 遺伝子が、単一の遺伝子ではなく複数の遺伝子を制御して細胞周期を調節していることを示唆している。更に、この発明によって、m i n a 5 3 が c - M y c 標的遺伝子の一つであり、細胞増殖を調節していることが示されている。したがって、M i n a 5 3 タンパク質は、サイクリン D 1、サイクリン D、I d 2 などのように細胞周期調節因子と直接相互作用することにより機能している可能性が考えられる。最近の研究では、核小体は真核生物細胞周期の調節に関与しているある種のタンパク質にとっては監獄の様なものとして機能していることが示唆されている。また、タンパク質が核小体中に封鎖封入されることは、そのタンパク質が細胞の別の領域にある標的に到達することを防止しているものと考えられる。

M i n a 5 3 タンパク質は、核に存在し、そのなかでも核小体中に集中している。核小体中に M i n a 5 3 が局在していることは M i n a 5 3 タンパク質の活性調節の 1 つの形態を示しているのかもしれない。

ショウジョウバエ (Drosophila) において、その M y c (d M y c) の欠失が細胞生育 (細胞質量の蓄積) を低下させ、細胞サイズを縮小するのに対し、d M y c の過剰産生が生育割合ならびに細胞サイズを増加することが示されている。このことは、d M y c が細胞生育に関与する遺伝子を調節することを示唆している。M y c の発現が増加し細胞サイズが大きくなることは哺乳類においても観察されている。例えば、免疫グロブリン重鎖エンハンサーのコントロール下で c - m y c を発現するトランスジェニックマウスでは、B リンパ球細胞の発達の全ての段階において正常な B リンパ球の細胞サイズを増加させる。この増加はタンパク質合成の増加と関連している。また、リボソーム生合成は、細胞増殖にとって必須であることから、核小体は 1960 年代から「リボソームファクトリー」であるといわれている。最近の報告では、m y c が、リボソーム生合成の機能を有する大きなセット多数の遺伝子の発現を促進することが示唆されていることもあわせて考えると、M i n a 5 3 が核小体中に局在しているということは、m i n a 5 3 がリボソーム生合成において必須の役割を果たしている可能性を示唆している。

また、核小体がある種の m R N A の加工もしくは核外への移送、シグナル認識粒子 R N A やテロメレース R N A の生合成、スプライセオソームの小さな核 R N A の 1 種の加工などを含む多くの他の側面に関与していることが示されている。これらの機能はまた細胞増殖にとって必須であると思われる。したがって、M i n a 5 3 はこれらの機能の一つに対して役割を果たしているのかも知れない。

しかしながら、M i n a 5 3 においては、その機能が実験的に示された既知のドメインは

10

20

30

40

50

見出されていない。ところが、M i n a 5 3のアミノ酸配列128 - 271番は、配列類似性に基づいて最近同定されたドメインJ m j Cのアミノ酸配列に良く整合している。J m j Cドメインはクప్పINFOLD (cupinfold) と呼ばれる構造を有する金属含有酵素に見られるが、DNA - もしくはクロマチン - 結合ドメインと一緒にしばしば見出される。このことから、J m j Cドメイン含有タンパク質は、クロマチンの構築を調節する酵素ではないかと考えられている。また、このドメインにおけるヒト、ラット、マウスのM i n a 5 3の87%は同じであり、全体の配列でも72% ~ 75%が同じである。このことはこのドメインの機能的な重要性を示唆している。したがって、M i n a 5 3はクロマチン再構築を調節し、種々の遺伝子発現のパターンに著しく影響を及ぼす可能性を持っているものと考えられる。

10

以上述べたように、m i n a 5 3と細胞増殖との関係が明らかであることから、m i n a 5 3はm y cの重要な標的であると考えられる。

次に、この発明の別の態様に係るタンパク質M i n a 5 3に対する抗M i n a 5 3モノクローナル抗体 (抗M i n a 5 3モノクローナル抗体) について更に詳細に説明する。

この発明に係る抗M i n a 5 3モノクローナル抗体は、大腸がん、肉腫、舌がん、脳腫瘍などのがん細胞中のタンパク質M i n a 5 3を検出することができ、かつ、高感度で染色することができる。従って、この発明に係る抗M i n a 5 3モノクローナル抗体などの特異的抗体や、m i n a 5 3遺伝子を含む配列を有するRNA、DNAなどを利用することによって、M i n a 5 3タンパク質や、M i n a 5 3をコードするmRNAを組織中で検出し、がん細胞などの正常でない細胞を検出することもできる。M i n a 5 3タンパク質の発現量は、ポリクローナル抗体やモノクローナル抗体などのM i n a 5 3タンパク質に結合する物質を利用して、例えば、ELISA法、ウェスタンブロットリング法などの手法によって測定することができる。また、細胞の状態は、例えば、m i n a 5 3遺伝子を含む配列を有するRNA、DNAなどを利用して、ノーザンブロットリング法、RNaseプロテクション法、RT-PCR法、cDNAマイクロアレイ法などの各種測定法によって測定することもできる。更に、M i n a 5 3タンパク質に対するポリクローナル抗体やモノクローナル抗体などの抗体を利用することにより、当該技術分野において慣用されているELISA法などの手法により体内に存在するがん細胞などの正常状態にない細胞の存在の有無やその量を推定もしくは測定して診断を下すことも可能である。

20

ここに、この発明に係る抗M i n a 5 3モノクローナル抗体は、当該技術分野に慣用されている常法に従って作製することができる。つまり、本発明に係る抗M i n a 5 3モノクローナル抗体は、ポリエチレングリコールを用いた細胞融合法や電氣的融合法などの融合方法、センダイウイルスやエプシュタイン - バール (E p s t e i n - B a r r) ウイルス等を用いた方法、遺伝子組み換えによる組み換え体や発がんプロモーター等による形質転換体を用いた方法などによっても調製することができる (Koehler, G., Milstein, C.: Nature 256, 495 (1975))。特に、ポリエチレングリコールを用いた細胞融合法によるハイブリドーマの樹立が好適である。

30

ここで、この発明において好適に使用することができるポリエチレングリコールを例にして細胞融合法によるハイブリドーマの樹立についてより詳細に説明する。

この発明において、抗原は、公知の方法により調製することができ、例えば、免疫原となるリコンビナントヒトタンパク質M i n a 5 3を、大腸菌などを利用して作製し、得られた精製タンパク質を必要に応じてアジュバントなどと混合することにより調製することができる。

40

次に、調製した抗原を免疫動物に対して免疫する。抗M i n a 5 3モノクローナル抗体を作製するためには、融合を用いる骨髓腫細胞との相性の問題により、免疫動物としては、近交系動物が確立しているマウスやラットを用いるのが好ましいが、例えば、牛、馬、ヤギ、ヒツジ、ニワトリなども使用することができる。免疫動物への免疫方法としては、一般的には、皮下注射、筋肉注射、腹腔内注射などの注射によって行うことができる。抗原の投与量は、所望の抗体価が得られ、かつ免疫動物に対して悪影響を与えない量であれば、適宜選択して決定することができる。なお、免疫に際しては、免疫応答を促進するため

50

に、免疫原を、必要に応じて、例えば、フロイント完全アジュバント、フロイント不完全アジュバント、水酸化アルミニウム等のアジュバントと併用することもできる。特に、合成ペプチドを免疫原として使用する場合には、B S A (Bovine Serum Albumin)、K L H (Keyhole Limpet Hemocyanine)等のキャリアタンパク質と架橋剤で結合したものを使用することもできる。

この発明に係る抗M i n a 5 3モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマの作製は、常法に従って行うことができる。すなわち、免疫動物に対する最終免疫後、抗体価の上昇を確認して、免疫動物から脾臓を取り出して脾細胞を得る。この脾細胞を、免疫に用いた同種動物由来の継代培養した骨髄種細胞と、融合促進剤の存在下において緩衝液中で融合させてハイブリドーマを作製する。使用できる骨髄腫細胞としては、公知の骨髄腫細胞、例えば、マウス由来のS P 2 / 0 - A g 1 4 , P 3 - N S 1 - 1 - A g 4 - 1 , M P C 1 1 - 4 5 , 6 . T G 1 . 7 など、ラット由来の2 1 0 . R C Y . A g 1 . 2 . 3 など; ヒト由来のS K O - 0 0 7 , G M 1 5 0 0 6 T G - A 1 2 などが挙げられ、適宜選択して使用することができる。また、脾細胞と骨髄種細胞との細胞数の割合は、通常約1 0 対1 ~ 約1 対1の範囲内、好ましくは約4 対1 ~ 約1 . 5 対1の範囲内となるような割合がよい。融合促進剤としては、ポリエチレングリコールや、センダイウイルス(H V J)などが使用できるが、取り扱い易さ、融合効率などの観点から、ポリエチレングリコールを使用するのが好ましく、ポリエチレングリコールのうちでも平均分子量が約1、0 0 0 ~ 5、0 0 0の範囲内にあるものが好ましい。また、このポリエチレングリコールの緩衝液中での濃度は、約4 0 ~ 6 0 重量%の範囲内にあるのが好ましい。また、融合効率を向上させるために、培地には、ジメチルスルホキシド等の補助剤を必要に応じて添加することもできる。

この発明による上記した脾細胞と骨髄種細胞との細胞融合は、電気融合法などの常法に従って行うことができ、通常、両細胞を、細胞融合剤を添加した動物細胞用培地または平衡塩類溶液を、例えば、3 7 の温度で約2 分間攪拌下で培養するなどの方法によって行うことができる。使用する動物細胞用培地としては、例えば、R P M I - 1 6 4 0 培地、ハクスM E M 培地(Hanks MinimumEssentialMedium)、イーグルM E M 培地(Eagle s Minimum Essential Medium)などが挙げられ、平衡塩類溶液としては、例えば、ハクス液(Hanks balanced salts solution)、アール液(Earle s balanced salts solution)などが挙げられる。

上記のようにして得られた細胞混合物から、タンパク質M i n a 5 3 に特異性を有する抗M i n a 5 3モノクローナル抗体を産生する能力を有するハイブリドーマは、常法に従って、次のようにして選別することができる。つまり、かかるハイブリドーマの選別は、まず、細胞融合操作終了後、得られた細胞混合物から脾細胞と骨髄種細胞とを細胞融合したハイブリドーマを分離し、続いてその分離したハイブリドーマから、タンパク質M i n a 5 3 に対して特異性を有する抗体を産生する能力を有するハイブリドーマを選別することによって行うことができる。

更に具体的には、上記細胞融合操作により得られた細胞混合物からハイブリドーマの分離は、かかる細胞混合物を融合細胞のみが増殖できる培養条件下で培養することによって、所望のハイブリドーマを選択的に増殖させることによって行うことができる。一般的には、該細胞混合物を、例えば、H A T 培地(ヒポキサンチン - アミノプテリン - チミジン培地)などの選別用培地で培養することによって、目的とするハイブリドーマを選択的に増殖することができる。H A T 培地中での細胞混合物の濃度は、通常、約 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^7$ 個/mlの範囲となるように調整するのがよい。このH A T 培地の培養は、通常、二酸化炭素を約5 ~ 8 %含む空気中において約3 7 の温度で約1 ~ 4 週間静置下にて行うのがよい。

次に、上記のようにして分離したハイブリドーマから、そのハイブリドーマがM i n a 5 3 に特異性を有する抗体を産生する能力を有するかどうかを判定して、ヒトタンパク質M i n a 5 3 に対して特異性を有する抗体を産生する能力を有するハイブリドーマを選別することができる。この判定は、例えば、R I A 法、E L I S A 法、ブランク法、スポッ

10

20

30

40

50

ト法、凝集反応法、オクタロニー法などによって行うことができる。このようにして選別されたハイブリドーマを、例えば、限界希釈法によってクローニングすることにより、M i n a 5 3 に特異性を有する抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を産生する能力を有する増殖可能なハイブリドーマ株を作製することができる。

このようにして作製された抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマは、ヒトタンパク質 M i n a 5 3 を認識することができ、通常の培地で継代培養することが可能であり、かつ、液体窒素中で長時間保存することもできる。

本発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体をかかるとハイブリドーマから採取するには、このハイブリドーマを常法に従って培養して、その培養上清として得る方法や、ハイブリドーマをこのハイブリドーマに適合性が認められる動物、例えば、骨髄腫細胞が由来する動物に投与して増殖させ、その腹水として得る方法等を用いて得ることができる。

また、本発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体の精製は、上記のようにして得た免疫動物の抗血清や、ハイブリドーマの培養上清ならびに腹水より得られた抗体を、例えば、硫酸塩析法、ゲル濾過法、イオン交換クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー等の当該分野で通常行われている既知の精製方法によって行うことができる。

なお、インビトロで免疫細胞をヒトタンパク質 M i n a 5 3 またはその一部の存在下で培養し、一定期間後に上記細胞融合手法を用いて、この免疫細胞と骨髄腫細胞とのハイブリドーマを調製し、抗体産生ハイブリドーマをスクリーニングすることによって、本発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を得ることもできる (Reading, C.L.: J. Immunol. Meth., 53, 261 (1982); Pardue, R.L., et al.: J. Cell Biol., 96, 1149 (1983))。

この発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体はがん細胞およびがん組織内においてヒトタンパク質 M i n a 5 3 を発現することができる。

この発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体は、白血病細胞株 H L 6 0 を用いたウェスタンブロットングによって、分子量 5 3 k D a の単一バンドを認識することができる。また、この抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いた免疫ブロットング分析によって、T P A で細胞処理をすると、5 3 k D a のバンドのシグナルが減少するが、これに対して、T P A 処理によっては - アクチンの発現は実質的には減少されないという特異的な減少が確認されている。

なお、本発明者らは、H L 6 0 細胞を、抗 M i n a 5 3 ポリクローナル抗体を用いて T P A で処理することによって、M i n a 5 3 の発現を減少させたことをすでに報告している (Tsuneoka, M., et al.: J Biol Chem 2002, 277: 35450-35459)。また、H L 6 0 細胞は、c - m y c の発現レベルが減少される T P A によって最終的に分化されることが報告されている (Hozumi, M.: AdvCancer Res, 1983, 38: 121-169; Hickstein, D.D., et al.: J Biol Chem 1989, 264: 21812-21817)。

更に、H e L a 細胞中に発現させたグリーン蛍光タンパク質 (G F P) に細胞融合させたタンパク質を用いた別の実験においても、この抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体が、内在性タンパク質 M i n a 5 3 に加えて、新たな単一バンドを発生したことを確認している。

これらの結果は、この発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体がタンパク質 M i n a 5 3 を特異的に認識することを示している。

この発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体は、大腸がん細胞株におけるヒトタンパク質 M i n a 5 3 を検出することができる。例えば、3 種類の増殖期の大腸がん細胞株、H T - 2 9、W i D r および S W - 6 2 0 を用いた抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体による免疫ブロットング分析の結果、抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体は、3 種類すべての細胞株において 5 3 k D a の単一バンドを認識することができた。このことは、これらの細胞株がタンパク質 M i n a 5 3 を発現し、抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体が、他のタンパク質と交差反応をせず、大腸がん細胞中のタンパク質 M i n a 5 3 を特異的に認識していることを示している。

これらの細胞株におけるタンパク質 M i n a 5 3 の発現レベルは、T P A によって実験的に減少させた H L 6 0 細胞中のタンパク質 M i n a 5 3 の発現レベルよりもより一層高か

10

20

30

40

50

った。他方、上記3種類の大腸がん細胞株におけるアクチンレベルは、TPA処理したHL60細胞のアクチンレベルよりも高くはなかった。これらの結果は、上記3種類の大腸がん細胞株が最終的に分化したHL60細胞よりも比較的高いレベルのタンパク質Mina53を含んでいることを示唆している。

また、この発明に係る抗Mina53モノクローナル抗体と抗ヌクレオリンラビット抗体とを用いた二重細胞免疫蛍光染色によって、タンパク質Mina53は、大腸がん細胞内に局在していることが確認されている。抗Mina53モノクローナル抗体は、細胞SW-620内の核を特異的に染色するとともに、その核質内の核小体に、ヌクレオリンに対するシグナルと重複する強力な点状の染色を施している。その他の2種類の細胞株も同一の免疫蛍光染色パターンを示した。これらの結果は、タンパク質Mina53が、本発明者らがHEL細胞についてすでに示したものと同様に(Tsuneoka, M., et al., ibid)、核小体内核質中に凝縮した状態で核内に局在していることを示唆している。

更に、この発明に係る抗Mina53モノクローナル抗体は、がん細胞に加えて、がん組織、例えば、大腸がん組織内のタンパク質Mina53を検出することができるとともに、大腸がんのいずれの組織病理学的等級において、つまり、十分に分化した腫瘍、中程度に分化した腫瘍およびあまり分化していない腫瘍においてもタンパク質Mina53を検出することができる。

以下に、この発明を実施例によって更に説明をするが、下記実施例は、この発明を説明する目的のために例示的に記載するものであって、この発明を一切限定する意図で記載するものではない。

実施例1：

(c-mycをコードするプラスミド)

ヒトc-mycをCMVプロモーター下に導入したPc-myc/CDM8(Tsuneoka, M. et al. (1997) Oncogene 14, 2301-2311)を用いた。またこのプラスミドを、PstIで消化し、自己ライゲートして、活性化ドメインが欠如している変異型c-Mycタンパク質をコードするpc-myc(d41-178)/CDM8を作製した。pTc-mycer/BSの2kbのBstXI-KpnIフラグメント(Klenow Enzymeで平滑化した)を、pCAGGS哺乳動物発現ベクターの5kbのEcoRIフラグメント(Klenow Enzymeで平滑化し、E.coliアルカリホスファターゼによって脱リン酸化した)中に挿入して、c-mycerがチキン-アクチンプロモーターとCMVプロモーターとから構成されたキメラプロモーター下に挿入したpc-mycer/CAGGSを作製した。

実施例2：

(mina53をコードするプラスミド)

ヒトmina53に対するcDNAを、ヒト赤血球白血病(HEL)ライブラリからの5'-GAAGCTTATGCCAAGAAAGCAAGCCTACAGG-3(開始コドンのメチオニンの直前にHindIII部位を追加)と、5'-TGAATTTCATCCTCTCCTCGGCTCAGGTCCT-3をプライマーとして使用してヒト赤白血病細胞(HEL)ライブラリーからPCRによって増幅した。増幅した1.4kbのフラグメントをpGEM-Tベクター(プロメガ社製)中にクローン化して、それぞれ465個ならびに464個のアミノ酸からなるタンパク質をコードするpT/hmina53(465)ならびにpT/hmina53(464)とを作製した。pT/hmina53(465)の1.4kbのHindIII-SalIフラグメントを、HindIIIとSalIとで切断したpGFP-CS(クロンテック社製)を用いて伸長してクローン化し、pEGFP/hmina53(465)を作製した。HindIIIとNotIとで消化したpT/hmina53(465)の1.4kbのHindIII-NotIフラグメントを、pRc/CMV(Invitrogen)中に挿入して、pmina53/Rc/CMVを作製した。ヒトmina53をコードするDNAフラグメントを、pEGFP/hmina53(465)からの5'-GCCATGGCCATGGCAAGAAAGCAAGCCTAC-3(NcoI部位を追加)と、5'-GGCATGGCCATGGCTAGACTACTTGAATTAAC-3(NcoI部位を追加)とをプライマーとして用いて、ヒトmina53をコードするDNAフラグメントを、pEGFP/hmina53(465)からPCRで増幅し、増幅した1.4kbフラグメントを、E.coli発現ベクターpET11d(Novage

10

20

30

40

50

n) (NcoIで切断し、E.coliアルカリホスファターゼで脱リン酸化した)を用いて伸長に挿入し、pET/hmina53を作製した。pEGFT/hmina53(465)の1.4kbのXhoI-SalIフラグメント(Klenow Enzymeで平滑化した)を、pGEX-3X(Pharmacia)(EcoRIで消化して、Klenow Enzymeで平滑化し、E.coliアルカリホスファターゼで脱リン酸化した)中に挿入して、pGEX-hmina53を作製した。

実施例 3 :

(mina53のゲノミックDNAフラグメントを有するレポータープラスミド)

そのプロモーター領域からイントロン1に伸長しているヒトmina53遺伝子のゲノミックDNAフラグメントを、プライマーとして5'-CGGGATCCTGAACGCGGAAACACCGCCGGGTAGC-3' (BamHI部位を追加)と、5'-CCCCAAGCTTCCTCTTCTCCAGTCTATCCTTC-3' (HindIII部位を追加)とを用いて、ヒトmina53遺伝子のプロモーター領域からイントロン1の一部までのゲノムDNA断片を、ヒト末梢血由来のDNAを鋳型としPCRで増幅した。その増幅した0.8kbのフラグメントを、BamHIとHindIIIとで切断した後、BglIIとHindIIIとで切断したpGL3(プロメガ社製)の4.8kbフラグメント中に挿入して、pMina(w)luciを作製した。pMina(w)luciをHindIIIとPmaCIで切断し、Klenow Enzymeで平滑化し、自己連結して-pMina(dE)luciを作製した。つぎに、Gene Editorインビトロ(in vitro)部位指向突然変異システム(プロメガ社製)を用いて、pMina(w)luciのE-ボックス部位に突然変異を導入し、その2個のE-ボックス(CACGTGエレメント)の一方もしくは両方をCACCTGに変異したpMina(mE1)luciと、pMina(mE2)luciと、pMina(mE1/2)luciとを作製した。

参考例 1 :

(その他のプラスミド)

アクチンプロモーターのコントロール下においてハイグロマイシン抵抗遺伝子を含有するpActHyg pActHygプラスミドはDr.M.Nakanishiから贈与されたものである(Tsuneoka,M.et al.(1997)Oncogene 14,2301-2311)。CMVプロモーターのコントロール下でRenilla reniformis luciferase遺伝子を含有するpRL-CMVプラスミドは市販されているもの(プロメガ社製)を入手した。

実施例 4 :

(RNAの調製とノーザンプロット分析)

RNAは、DEPCで処理した市販のRNA調製液セット(ナカライテスク社製)を用いて、酸グアニジウム・チオシアネート・フェノール・クロロホルム抽出法によって細胞から単離した。抽出したRNAは、ホルムアルデヒド含有アガロースゲルを用いて電気泳動をし、ハイボンDN(アマシャム社製)に転写し、³²Pで標識したcDNAプローブで検出した。プローブは、市販のMultiprimeラベリングキット(アマシャム社製)を用いて[-³²P]dCTPで標識した。結果はBAS200イメージ分析(富士フィルム社製)を用いて定量した。

実施例 5 :

(プローブDNAの調製)

c-mycと、mina53と、CD18とのDNAプローブは次のようにして調製した。

c-mycの調製 :

ヒトc-myc cDNAを含有するpc-myc/CDM8からの1.6kbのHindIII-XbaIフラグメントを調製した(Tsuneoka,M.,et al.:(1997)Oncogene 14,2301-2311)。

mina53の調製 :

上記pEGFP/hmina53(465)からの5'-CAGAGCTGTCAACAACCAAGGTGGAAAGTTAC-3'と、5'-TGAAATTCATCCTCTCTCTCGGCTCAGGTCTT-3'とをプライマーとして使用して、PCR法にて増幅して得られた442bpのフラグメントを使用した。

CD18の調製 :

10

20

30

40

50

T P A 10nM中で24時間培養したH L 6 0細胞から単離した全RNAからの5' - G T T T G C C A C T G A T G A C G G C T T C C A T T C - 3' と、5' - A A C A C G C A C C T A A C C T C A C C A A C C T C A A - 3' とをプライマーとして使用して、RT - PCR法にて増幅して得られた1.8kbのフラグメント。C D 1 8 c D N Aの配列は直接シーケンス法によって確認した。

実施例6：

5' - R A C EおよびRT - PCRプロトコルについて説明する。

(ポリメラーゼ・チェーン・リアクション(PCR))

各プライマー10pmoleと、EX Taq DNAポリメラーゼ(宝酒造社製)1.2Uと、dNTP 200 μMとを含むEX Taqバッファ50 μlを用いて増幅を行った。

10

(5' - R A C E (Rapid Amplification of 5' cDNA Ends) 分析)

HE L細胞のポリ(A) + RNA (1 μg) から、逆転写反応、2重鎖cDNA合成およびアダプターライゲーションを、マラソン(Marathon) cDNA増幅キット(クロンテック社製)を用いて行った(Koda, Y. et al.: (1997) J. Biol. Chem. 272, 7501-7505)。第1 PCRは、プライマーとして、m i n a 5 3 - R A C E - 1 (5' - G C A G T A C T G T G A G G A C A A T G T G G T C T T - 3') と、A P 1プライマーとを使用して行った。温度プロファイルは、94 °Cで1分間の初期熱変性後、96 °Cでの15秒間の熱変性工程、68 °Cでの3分間のアニーリング工程と伸張工程とを1サイクルとして25サイクルの処理をした。上記第1 R A C E - PCR生産物を1000倍希釈した液1 μlをネスト R A C E - PCRのためのテンプレートとして使用した。ネスト R A C E - PCRは、m i n a 5 3 - R A C E - 2 (5' - C A A C C A A G G A G C C A A A G T A A C A T T C - 3') と、A P 2プライマーとを使用して行った。温度プロファイルは、94 °Cで1分間の初期熱変性後、96 °Cでの15秒間の熱変性工程、68 °Cでの4分間のアニーリング工程と伸張工程とを1サイクルとして25サイクルの処理をした。

20

(RT - PCR (Reverse Transcriptase-PCR))

HE LもしくはR C N - 9細胞もしくはマウスの胃の細胞の一本鎖cDNAを、市販のスーパースク립ト(Superscript)一本鎖cDNA合成キット(Invitrogen)を用いて全RNA (1 μg) に対して合成した。得られた1重鎖cDNA 1 μl(全量20 μl)をPCRの鋳型として使用した。増幅用のRT - PCR用プライマーとしては、ヒトに対しては、m i n a 5 3 R T - F (5' - A C A C C G G T G A C G A G C G C A C G G A A A G - 3') と、m i n a 5 3 R T - R (5' - G C C T C T C A T C T G T G G G G A A G T A T T A - 3') とを、ラットとマウスに対しては、ラット m i n a 5 3 R T - F (5' - T T T C C T C C C T A C T T G T G A A C A A T G C - 3') と、ラット m i n a 5 3 R T - R (5' - A A T G A T G C T C T T T A A A G G A G T T A T T T - 3') とを使用した。温度プロファイルは、98 °Cでの15秒間の熱変性工程と、65 °Cでの1分間のアニーリング工程と、72 °Cでの2分30秒間の伸張工程を1サイクルとして35サイクルの処理をした。

30

実施例7：

(細胞培養)

ヒト膠芽腫細胞株T 9 8 G細胞を非必須アミノ酸と10%ウシ胎児血清(FCS)含有イーグル培地中で培養した。He L a細胞、ラット繊維芽細胞株3 Y 1およびその誘導体を、10% FCS添加ダルベッコ補正イーグル培地中で培養した。ヒト前骨髄性白血病細胞H L 6 0を、20% FCS添加R P M I 1 6 4 0培地中で培養した。ラット結腸がん細胞株R C N - 9を、R I K E N細胞バンクから入手して、10% FCS添加R P M I 1 6 4 0培地中で培養した。M y cまたは活性化ドメインを欠損したc - M y cを発現する3 Y 1細胞を確立するために、20 μgのpc-myc/CDM8もしくはpc-myc(d41-178)/CDM9と、0.4 μgのpActHygとを用いて、カルシウム - リン酸方法によって、細胞に遺伝子導入した(Chen, C.A., et al.: (1988) Biotechniques 6, 632-638)。得られた細胞は200 cells/mlのハイグロマイシンを含有する培地中で2週間培養した。個々のクローンを単離し、c - M y cもしくは変異型c - M y cタンパク質の発現を、抗c - M y c抗体を使用してウェスタンブロット

40

50

分析法によって検出した。クローン3Y1MycAと3Y1MycB(c-Mycタンパク質を発現している)およびクローン3Y1Myc(dTAD)Aと3Y1Myc(dTAD)B(大部分の活性化ドメインを欠損している変異型c-Mycタンパク質を発現している)が確立された。c-MycERキメラタンパク質(T98Gmycer-2)を発現するT98G細胞を確立するために、20gのp c-mycer/CAGGSと、0.4μgのpActHygとを用いて、細胞を形質転換し、個々のクローン中のc-MycERの発現は上記のようにして検出し、T98Gmycer-2を確立した。

実施例8:

(DNAチップ(cDNAマイクロアレイ)を用いた示差ディスプレイ)

未処理のT98Gmycer-2細胞とOHTで20時間処理した細胞から全RNAを単離した。ポリ(A+)RNAを回収し、市販のDNAチップ(インサイト社製)を用いて示差ディスプレイに適用した。発現配列タグ(EST)クローンを含む約9千種類のcDNAをチップにプレートした(UniGEM Human VVer.2)。

10

実施例9:

(トランジェント発現アッセイ)

T98Gmycer-2細胞を10% FCSを追加した培地中で生育した。3×10⁴個の細胞をディッシュ(12ウエルプレート;ウエルの直径:22mm)中にプレートし、20~24時間培養した。1gのレポータープラスミドとインターナルマーカーとして20ngのpRL-CMVをFuGENE6試薬(ロッシュ・ダイアグノスティクス社製)を用いて細胞に導入した。レポーター遺伝子導入1日後、OHT(最終濃度が0.2Mになるように)を添加してMycERキメラタンパク質を活性化して、更に17時間培養した。次いで、細胞を回収して、ファイアフライ・ルシフェラーゼ(firefly luciferase)ならびにレニラ・レニホルミス・ルシフェラーゼ(Renilla reniformis luciferase)の活性をデュアル・ルシフェラーゼレポーターアッセイ系(dual-luciferase reporter assay system)(プロメガ社製)を用いて定量した。Renilla reniformisルシフェラーゼ活性値を用いて試料間の遺伝子導入程度を標準化した後、活性化MycERを有する細胞からのfireflyルシフェラーゼ活性を、MycER活性化していない細胞からの活性に対する比率として表した。MycERの活性化によらないOHTの効果を標準化するために、T98Gmycer-2細胞からの値を、上記T98Gmycer-2細胞と同一方法で処理したT98G親細胞からの値で割った値を求め、MycERキメラタンパク質の活性化に対するレポーター遺伝子の反能性反応性とした。なお、値は4回実験をしてその平均値で表している。

20

30

実施例10:

(クロマチン免疫沈降)

クロマチン免疫沈降実験は、c-Mycに対する抗体ならびにコントロール抗体を使用し行うとともに、抗体を使用しないコントロールも行った。この実験では、c-Mycに対する抗体は2種類使用した。1つはc-MycのN-末端側半分と反応し、もう1つはC-末端側半分に主に結合するものである。アッセイは基本的にはすでに発表された方法に従って行った(Boyd,K.E.,et al.:(1997)Mol.Cell.Biol 17.2529-2537)。免疫複合体は、非特異的な結合を妨げるように処理をしたプロテインAビーズ(50%容量/容量)20μlを添加することによって回収した。上記文献記載のようにして、ビーズを洗浄し、DNAフラグメントを溶出し、溶出した溶液をフェノール/クロロホルムで抽出し、エタノールで沈降させた。免疫沈降したDNAフラグメントはPCRによって検出した。使用したPCRプライマーは、5'-GCCGGCGCTGTGGTTGCGGGACCTG-3'と、5'-TCCTCTTCCCTCCAGTCTATCCTTC-3'であり、これらのプライマーを使用してヒトmin a53遺伝子の転写開始部位の近くにE-ボックスを含む483bpのフラグメントを増幅する。別のプライマーとしては、5'-TACAGGTAAGCCCTCCAATGACC-3'と、5'-GCAAGCTACCAATTTAGGAACCC-3'とを使用して、第22番染色体中の検出可能な遺伝子を有しない領域に位置している(Bouchard,C.,et al.:(2001)Genes & Dev 15, 2042-2047)E-ボックスにおけるゲノミック配列を増幅する。このE-ボックスは検出可能な遺伝子を有しないクロモソーム中に位置している(Bouchard,C.,et al.:(2001)Genes & Dev

40

50

15, 2042-2047)。

実施例 1 1 :

(抗体)

ヒト *mina 53* の *lys 3* からカルボキシル基末端までの部分は、市販の *E. coli* BL21 (DE3) (Novagen) 中で pET/hmina53 を用いて発現し、SDS-PAGE によって単離、精製した。この組換えポリペプチドでラビットを免疫した。GST 融合タンパク質 GST-Mina 53 を *E. coli* JM109 中で pGEX-hmina53 を用いて発現し、グルタチオン・セファロース (Pharmacia) によって単離した。組換え GST-Mina 53 ポリペプチドを結合したセファロース 4 B を用いてラビットの血清から抗体を上記文献に従って精製した。1 個の抗 c-Myc 抗体はすでに報告したものを用了。

10

参考例 2 :

その他の抗体は市販のものを使用した。その他の抗体としては、抗 c-Myc 抗体 (N262) (サンタクルス社製)、抗ヌクレオリンマウスモノクローナル抗体 (C23 (サンタクルス社製)、ヤギ抗ラビット IgG-HRP 抗体 (サンタクルス社製)、アレクサ 488 結合抗マウス IgG (モレキュラー・プローブ社) および Cy3 結合抗ラビット IgG (ザイメッド・ラボラトリーズ社製) を使用した。

実施例 1 2 :

(ウェスタンブロット分析および間接免疫蛍光染色)

ウェスタンブロッティングは実質的には上記文献記載のとおりに行った (Tsuneoka, M., et al.: (1988) J. Biochem. 104, 560-564)。細胞をトリプシン処理し、100mM トリス (pH6.8)、0.1M DTT、20% グリセロールを含む 3% SDS 溶液中に回収し、4~20% ポリアクリルアミド上で分離し、ポリビニリデンジフルオリド (PVDF) ミリポアメンブレン (ミリポア社製) に移行した。抗体で処理した後、シグナルを ECL 強化化学発光法 (アマシャム・ファルマシア社製) を用いて検出した。

20

間接免疫蛍光法のために、6 ウエルプレートのガラスカバースリップ上で生育した *HeLa* 細胞を -20℃ で 10 分間メタノール中で固定した。抗 *Mina 53* ラビット抗体と抗ヌクレオリンマウスモノクローナル抗体を添加し、37℃ で 120 分間反応した。0.1% スキムミルク PBS 懸濁液で 3 回洗浄した後、Alexa 488 結合抗マウス IgG ならびに Cy3 結合抗ラビット IgG を添加し、37℃ で 120 分間反応し、0.1% スキムミルク PBS 懸濁液で 3 回洗浄した。最後に、細胞をイムノン (Immunon) (テルモ・シャンドン社製) 中に埋設し、蛍光顕微鏡で観察した。

30

実施例 1 3 :

(RNA の調製および siRNA の細胞中への導入)

21 個のヌクレオチドからなるスモール・インターフェアリング (small interfering) RNA (siRNA) 二本鎖が、*HeLa* 細胞を含む哺乳動物の細胞株中で遺伝子発現を特異的に抑制するとの報告が最近なされている (Elbashir, S.M., et al.: (2001) Nature 411, 494-498)。そこで、21 個のヌクレオチドからなる siRNA であって、ヒト *mina 53* ならびにラット *mina 53* (19 個のヌクレオチドのうち 5 個がヒト *mina 53* のそれとは異なる) に対して特異的な siRNA 二本鎖 2 重ラセンを常法にしたがって化学的に合成した。非特異的コントロールとして、ヒト *mina 53* siRNA とは逆方向配列を有する二本鎖も同様に合成した。ヒト *Mina 53* およびラット *Mina 53* を標的とする siRNA 配列は、開始コドンの第 1 ヌクレオチドに対して位置 45-63 を使用し、3' 末端に 2 つのデオキシチミジン を付加している。siRNA をアニールし、実質的には文献記載の方法と同じ方法で細胞に導入した (Elbashir, S.M., et al.: (2001) Nature 411, 494-498)。siRNA 導入の 24 時間前に、指数関数的生育期の細胞をトリプシン処理し、12 ウエルプレートにプレートした。siRNA は 1 ウエルあたり siRNA 200 pmole と、市販のオリゴフェクタミン (Oligofectamine) (ライフテクノロジー社) とを用いて細胞に導入した。ただし、*HeLa* 細胞は、無血清培地では 20 時間以上培養し、3Y1MycB 細胞では同様に 10 時間培養し、siRNA を導入した。

40

実施例 1 4 : 抗ヒト *Mina 53* モノクローナル抗体の作製

50

(抗原)

大腸菌を利用してリコンビナントヒトM i n a 5 3タンパク質を作製した。精製したタンパク質をMPL+TDMアジュバントシステム(シグマ社)と混合することにより感作用抗原溶液とした。

(免疫スケジュール)

生後8週から10週のマウス(Balb/c)の後ろ足のひらに0.1ml(0.5mg/ml、M i n a 5 3タンパク質)ずつ、合計一匹当たり0.2mlの上記抗原溶液を注射し1回の感作とした。初回の注射をしてから、3日後、6日後に同様の方法で抗原を注射した。14日後にアジュバントと混合しない抗原を上記と同量、同様の方法により注射しブースト(Boost)した。

10

(B細胞の回収)

最後の注射(Boost)から4日後に後ろ足付け根のリンパ節を無菌的に取り出し、滅菌したスライドガラス2枚を使ってリンパ節組織を摺り潰して壊してB細胞を回収した。

(細胞融合)

回収したB細胞をマウスミエローマ細胞株F01細胞と10:1の割合で混合した後、ポリエチレングリコール(PEG)4000を用いて両者を細胞融合した。

(ハイブリドーマの選択)

融合した細胞は96穴培養皿で培養した。培地は5%Briclone(大日本製薬)、20%牛胎児血清、HAT溶液を含むPRMI1640培地を用い、B細胞と融合したマウスミエローマ細胞(ハイブリドーマ)のみを選択的に生存させた。この時、ハイブリドーマ生育を助けるため融合していない胸腺細胞と共に培養した。

20

上記のようにして、4個のハイブリドーマを選別し、このうちの1つ(mouse-mouse hybridoma MT/HK-1)を、平成15年4月9日に独立行政法人産業技術総合研究所特許生物寄託センター(日本国茨城県つくば市東1丁目1番地1中央第6)にFERM P-19298として寄託している。

実施例15:抗M i n a 5 3モノクローナル抗体活性の測定法

精製したリコンビナントヒトタンパク質M i n a 5 3を10mM Tris(pH8.0)溶液に3~10g/mlの濃度になるように調整し、得られた溶液0.1mlをマイクロタイタープレートの各ウェル中に加え、3時間から1昼夜室温で放置した。その後、溶液を捨て、1%スキムミルクを含むPBS(phosphate buffered saline)溶液を0.2ml加えて4で保存した(ブロッキング操作)。プレートは2時間から1週間以内に使用した。1%スキムミルク溶液を捨てた後、PBSでウェルを2回洗浄後、測定に供する溶液0.1mlを加え、37で2時間あるいは4で1昼夜インキュベーションした。ウェルを3回PBSにより洗浄した後、西洋ワサビパーオキシダーゼを結合した抗マウスIgG溶液を0.1ml加え、37で2時間あるいは4で1昼夜インキュベーションした。その後、ウェルを3回PBSにより洗浄した後、パーオキシダーゼの基質であるo-PDA溶液(0.4mg/ml o-フェニレンジアミンの0.1Mクエン酸塩溶液、0.2M Na₂HPO₄, 0.005% H₂O₂)を0.1ml加え、室温で15分から30分間放置した後、0.05mlのオキサレート溶液を加えて反応を停止した。450nmでの吸収を測定することにより、パーオキシダーゼ活性を測定した。

30

上記ハイブリドーマを培養した培地中の抗M i n a 5 3抗体活性の測定は、培養を始めてから14日後と21日後に培養液0.1mlをとり、上記方法により行った。

40

実施例16:ウエスタンブロッティング

HeLa細胞をSDS溶液(3% SDS、0.125M Tris(pH6.8)、20mMジチオスレイトール、20%グリセロール)により100で10分間抽出し、SDS-PAGEし、ポリビニリデンジフルオライド微孔性メンブレン(Millipore, Bedford, MA)に移した。そのメンブレンをハイブリドーマ培養液と37で30分間反応させた後、洗浄し、さらに西洋ワサビパーオキシダーゼを結合した抗マウスIgG溶液と37で30分間反応させた後、再び洗浄した。シグナルは、市販のエンハンスド・ケミルミネッセンス・テクニク(enhanced chemiluminescence technique (Amersham Bioscience))システムにより検出し、ウエスタンブロット解析をした。

50

実施例 17 : 抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体の精製

プリスタン (2,6,10,14-テトラメチルペンタデカン.) を 2 週間程度前にあらかじめ腹腔に注射したマウス (balb/c) に、上記ハイブリドーマを腹腔に注射した (2×10^6 /頭)。10 ~ 20 日後、18ゲージ注射針を用いて腹水を回収した。腹水は、硫酸分画し、抗体活性を示す画分を、10mM Tris (pH8.0) により透析した。あらかじめ10mM Tris (pH8.0) に平衡化した DE - 5 2 (ワットマン社) に上記画分を添加し、0 - 0.2M の塩化ナトリウムの濃度勾配をもつ10mM Tris (pH8.0) により溶出し、溶出画分中の抗 M i n a 5 3 抗体活性を測定した。高い抗 M i n a 5 3 抗体活性を持つ画分を集めて精製し、精製抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を得た。

実施例 18 : 抗ヒト M i n a 5 3 抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いた組織診断

抗ヒト M i n a 5 3 マウス抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いて、大腸がんを次のようにして染色した。その結果、非がん部組織に比べて、大腸がん部分が強く染色された。

(抗ヒト M i n a 5 3 マウス抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体による組織染色法)

まず、ホルマリン固定し、パラフィン包埋したブロックを約 $3 \mu\text{m}$ 厚さにスライスし、スライドグラス上にマウントした。このスライドグラス上の切片をキシレンに浸けて 37 で 15 分間放置した。15 分後、新しいキシレンに変えた。このキシレン処理を全部で 3 回行って脱パラフィン処理を行った。このように脱パラフィン処理を行った切片を、99% エタノールに浸け、10 分後に新しい 99% エタノールに変えた。このエタノール処理を全部で 3 回行った後、さらに 95%、90%、70% と段階的に含水率の高いエタノールに各 5 分間ずつ浸けた。更に、水に 5 分間浸けて水洗した。水洗した切片を、10mM クエン酸緩衝液 (pH6.0) 中で 121 で 20 分間オートクレーブ処理し、抗原性を回復させた。その後、室温に戻してから水洗し、PBS 溶液に浸漬した。

次に、0.05% ツイーン 20 を含む PBS 溶液で 1 回洗った後、試料を 3% H_2O_2 の PBS 溶液を用いて室温で 30 分間処理することにより、内在性のパーオキシダーゼ活性を失活させた。

得られた試料を 0.05% ツイーン 20 を含む PBS 溶液により 2 回洗浄し、1% スキムミルクと 5% ウサギ血清を含む PBS 溶液を用いて室温で 30 分間処理することにより、抗体の非特異的結合を防ぐブロッキング操作を行った。

抗体を 1% スキムミルクを含む PBS 溶液により希釈し最終濃度を $3.5 \mu\text{g/ml}$ にし、上記のようにブロッキング操作をして得られたスライドグラス上の試料の上に添加し、4 で一晩反応させた。翌日、試料を 0.05% ツイーン 20 を含む PBS 溶液によって 3 回洗浄し、ビオチン化した抗マウス IgG ウサギ抗体と室温で 30 分間反応させた。

反応後、得られた試料を 0.05% ツイーン 20 を含む PBS 溶液により 3 回洗浄後、西洋ワサビパーオキシダーゼを結合させたストレプトアビジンと反応させた。得られた試料を 0.05% ツイーン 20 を含む PBS 溶液により 3 回洗浄後、3,3'-ジアミノベンジジン (DAB) 基質溶液を加え室温放置し、パーオキシダーゼ活性を持つ部分を茶色に発色させた。その後、4 分間水洗することにより、パーオキシダーゼ反応を止めた。次いで、ヘマトキシリンで染色した後、スライドグラスを脱水し包埋した。

実施例 19 : 抗ヒト M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いた溶液中の M i n a 5 3 タンパク質の定量

上記で得られた抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を 2 つ組み合わせることにより M i n a 5 3 タンパク質をサンドウィッチして定量をすることができた。

(マイクロタイタープレートによる M i n a 5 3 の定量)

抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を、西洋ワサビパーオキシド結合キット (Alpha Diagnostic International, San Antonio, Texas, USA) を用いてキットの指示に従って標識して、西洋ワサビパーオキシドを結合した抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を調製した。

更に、0.1M クエン酸塩 / 0.2M Na_2HPO_4 溶液に 0.4mg/ml の濃度で o-PDA を溶解し、-80 で保存し、使用直前に 1000 分の 1 容量の 5% 過酸化水素水を加えて、o-フェニレンジアミン溶

10

20

30

40

50

液を調製した。

他方、もう一つの抗体20 μ g/mlを10mM Tris (pH6.8) 溶液に溶解し、この溶液をマイクロタイタープレートの各ウェルに50 μ lづつ加え、37 $^{\circ}$ Cで2時間あるいは4 $^{\circ}$ Cで一昼夜インキュベーションした。続いて、抗体溶液を捨てた後、1%スキムミルクを含むPBS溶液を200 μ l加え、37 $^{\circ}$ Cで2時間あるいは4 $^{\circ}$ Cで一昼夜インキュベーションした。この後、1ウェルあたり試料50 μ lを加え、37 $^{\circ}$ Cで2時間あるいは4 $^{\circ}$ Cで一昼夜インキュベーションした。この際、必要に応じて、試料はウシ胎児血清を用いて希釈した。次に、PBSを用いて3回洗浄した後、希釈した西洋ワサビパーオキシドを結合した上記抗体溶液を1ウェルあたり50 μ l加え、37 $^{\circ}$ Cで2時間あるいは4 $^{\circ}$ Cで一昼夜インキュベーションした。更に、PBSを用いて3回洗浄した後、o-フェニレンジアミン溶液を1ウェルあたり50 μ l加え、37 $^{\circ}$ Cで10 - 15分間インキュベートして、その発色を定量した。

10

実施例20：

(ウエスタンブロッティング)

ウエスタンブロッティング分析のために、ヒト大腸がん細胞株HT-29、SW-620ならびにWidRをそれぞれ10% FCS含有ダルベッコ改変イーグル培地で培養し、ヒト前骨髄細胞白血球細胞株HL60を10% FCS添加RPMI 1640培地で培養した。このように培養した細胞を、トリプシンおよびEDTAを含むリン酸緩衝液(PBS)で処理して集め、PBSで洗浄した。次いで、細胞を、3% SDS、50mMジチオスレイトールおよび20%グリセロールを含む0.125MトリスHClバッファ(pH6.8)溶液に懸濁し、10分間煮沸して4~20%勾配SDSポリアクリルアミドゲルを用いて分離した。タンパク質をポリビニリデンジフルオリドマイクロポアメンブレンに移し、1%スキムミルクを含むPBS溶液で処理し非特異的結合部位をブロックした。マウス抗Mina53モノクローナル抗体およびHRP共役ヤギ抗マウスIgG抗体で処理した後、エンハンスト・ケミルミネッセンス(ESL)ウエスタンブロッティング試薬システムを用いてシグナルを検出した。ローディングコントロールとして、メンブレンを剥離バッファで処理した後、抗アクチンモノクローナル抗体によって再プローブした。

20

図6Aはウエスタンブロッティング分析結果を示している。ウエスタンブロッティング分析は、TPAの非存在下で培養したHL60細胞(レーン1)、TPAの存在下で培養したHL60細胞(レーン2)および大腸がん細胞株WidR(レーン3)、HT-90(レーン4)ならびにSW-620(レーン5)からそれぞれ調製した細胞溶菌液を電気泳動後、抗Mina53モノクローナル抗体を用いて行った(上側パネル)。

30

(間接免疫蛍光染色)

間接免疫蛍光染色するために、上記HT-29、SW-620ならびにWidR細胞を、6ウェルプレートのガラスカバースリップ上で生育させ、メタノール中において-20 $^{\circ}$ Cで10分間固定した。1%スキムミルクを含むPBS溶液でブロッキングした後、マウス抗Mina53モノクローナル抗体および抗ヌクレオリン(nucleolin)ラビットポリクローナル抗体を添加して、37 $^{\circ}$ Cで120分間インキュベーションした。0.1%スキムミルクを含むPBS溶液で3回洗浄した後、アレクサ(Alexa)488共役抗マウスIgG抗体およびCy3共役抗ラビットIgG抗体を添加し、37 $^{\circ}$ Cで120分間インキュベーションし、0.1%スキムミルクのPBS溶液で3回洗浄した。最後に、細胞をイムノン(Immunon)内に包埋して蛍光顕微鏡で観察した。

40

図6Bは、細胞内におけるタンパク質Mina53の局在を示している。図6において、大腸がん細胞株SW-620内におけるタンパク質Mina53の局在を、抗Mina53モノクローナル抗体で間接免疫染色することによって目視観察した結果を示した(a)。また、抗ヌクレオリンラビットポリクローナル抗体で染色した結果を目視観察した結果を示した(b)。更に、両者を重ねた画像を示した(c)。

実施例21：

24名の原発性大腸腫瘍患者から採取した標品をホルマリンで固定し、パラフィンに包埋した試料を使用した(Fujitani N, et al.: Glycoconjugate J 2000, 17:331-338)。これらの標品には、23例の大腸腺がんが含まれていて、そのいくつかの例は高度に浸潤してい

50

て、またいくつかの例はリンパ管浸潤を示していた。また1例は腺腫であった。組織切片を、ヘマトキシリンおよびエオシン(HE)染色に基づいた組織病理学的勾配システムに従って、高分化、中分化および低分化とに分類した。組織の特徴の概要を表1に示す。

実施例22:大腸がん細胞の免疫染色

脱パラフィン化した10%ホルマリン固定・パラフィン包埋大腸がん組織を、ストレプトアビジン・ビオチン・コンプレックス・イムノパーオキシダーゼ法によって免疫染色した(Fujitani, N., et al.: J Histochem Cytochem 2000, 48:1649-1656)。

抗原を回復させるために、切片をマウントしたスライドを、10mMクエン酸ナトリウムバッファ(pH6.0)中で20分間オートクレーブした。3%過酸化水素を含むPBS溶液、次いで1%スキムミルクと5%ラビット血清を含むPBS溶液で前処理した後、最終濃度3.5μg/mlの抗Mina53抗体を含む1%スキムミルク溶液または抗Ki-67抗体を、湿ったチェンバー中において4で一昼夜反応させた。0.05%ツイーンのPBS溶液で3回洗浄した後、切片を、ビオチン化ラビット抗マウスIgG抗体、続いてHRP-ストレプトアビジン・コンジュゲートとインキュベーションした。次いで、3、3-ジアミノベンジジンと過酸化水素を用いて、Mina53については4分間、Ki-67については2分間発色させた後、水で洗浄して反応を停止させた。ヘマトキシリンで対比染色した後、スライドを脱水し、カバーガラスをかけた後、顕微鏡で観察した。

(免疫組織化学的染色の評価)

下表1に示す染色強度については、各切片を目視観察することによって0から3までの点数で記録した。点数は、最高の染色強度を有する切片を3点とし、最低の染色強度を有する切片を1点とし、染色しなかった切片を0点とした。染色された細胞の割合を推定するために、画像をデジタルカメラで撮影し、表示視界内の陽性細胞の数を数えて、染色細胞の割合(%)で表した。また、下表1における染色インデックスは、染色強度に染色細胞の平均割合%を乗じた値として計算した。

実施例23:リコンビナントヒトタンパク質Mina53の定量

大腸菌で作製したリコンビナントヒトタンパク質Mina53を0.1-1000ng/mlの濃度になるようにウシ胎児血清を用いて調整し、ELISA法により定量した。その結果、1-1,000ng/mlのリコンビナントヒトタンパク質Mina53を定量することができた(図10)。

実施例24:

実施例23に示した方法により正常人からの血液中のMina53の量を定量したところ、0-5ng/mlのMina53を検出した。また、乳がんの患者の血液中に正常値よりも高いレベルである64ng/mlのMina53を検出した(図11)。

上記実施例から、このELISA法は血中のMina53を定量することができる。わかる。

実施例25:食道がん細胞の染色

上記実施例で得た抗Mina53モノクローナル抗体を用いて食道がん細胞を染色し、現在ヒト食道がん細胞の染色に使用されている抗Ki-67モノクローナル抗体による食道がん細胞の染色による染色具合と比較した。

38人の食道がん患者からの食道がん組織を、抗Mina53モノクローナル抗体あるいは抗Ki-67モノクローナル抗体により染色し、それぞれの試料における抗Mina53モノクローナル抗体あるいは抗Ki-67モノクローナル抗体の染色インデックスを求めた。本実施例において、染色インデックスは、抗Mina53モノクローナル抗体の染色インデックスを横軸に、抗Ki-67モノクローナル抗体の染色インデックスを縦軸にとり、それぞれの食道がん組織の価をプロットした。なお、染色インデックスは、染色強度×染色されている細胞の割合により求めた。その結果は図13に示す。

また、食道がんのがん悪性度と、Mina53あるいはKi-67の染色インデックスとの関係を調べ、その結果を図12に示す。図12(A)にはMina53の染色インデックスと食道がんのがん悪性度との関係を、また図12(B)にはKi-67の染色インデックスと食道がんのがん悪性度との関係を示している。なお、図12(A)は、Mina53の染色インデックスが0~1.8と、1.9~4との2つのグループに分け、カブラ

10

20

30

40

50

ン・マイヤー (Kaplan-Meier) 法により解析した結果を、また、図 12 (B) は、Ki-67 の染色インデックスが 0 ~ 0.6 と、0.7 ~ 4.0 との 2 つのグループに分け、 Kaplan-Meier 法により解析した結果を示している。

結果

上記実施例では、c-Myc 活性を条件付に活性化するために、エストロゲン誘発性 Myc システムを使用した (Eilers, M., et al.: (1989) Nature 340, 66-68)。キメラタンパク質 c-MycER は、ヒト c-Myc と、ヒトエストロゲンレセプターのエストロゲン結合ドメインとから構成されている。c-MycER は、エストロゲンの不存在下で細胞骨格成分に結合している。エストロゲンもしくはその誘導体 4-ヒドロキシタモキシフェン (OHT) がキメラタンパク質に結合したとき、細胞骨格から遊離して c-Myc として機能する。ヒト膠芽腫細胞株 T98G を異所性 c-Myc 活性を導入する親細胞として使用した。c-MycER タンパク質 (T98Gmycer-2) を発現する T98G 細胞株を確立した。

10

指数関数的に増殖する状態にある細胞を、OHT の存在下もしくは不存在下で 20 時間培養し、全 RNA を単離し、上記に記載した cDNA マイクロアレイ分析に付した。すでに報告されている Myc 標的遺伝子、つまり、ODC と、ヌクレオリン (nucleolin) の特定のシグナルは、c-MycER の活性に伴って、それぞれ 2.6 倍と 1.6 倍増加した。これらの結果は、Myc 標的遺伝子がこれらの実験システムにより検出され得ることを示している。

上記実施例において、c-Myc の機能を調べるために、c-MycER 活性化によって刺激され発現上昇した遺伝子のうちでヒト発現配列タグ (EST) 配列について調べた。その結果、EST クローン W27666 に対するシグナルが c-Myc 活性によって 1.9 倍程刺激され発現上昇することが分かった。この上昇率は、c-Myc 標的遺伝子である ODC とヌクレオリンについてここで測定した値と類似していた。

20

W27666 の 5' - 上流部をコードする cDNA 分子を、ヒト赤血球腫瘍白血病細胞 (Human Erythroid Leukemia: HEL) ライブラリーから 5' - RACE プロトコールを用いて単離した。また、5' - 末端の配列が異なる 2 種の cDNA を単離した。5' - RACE 実験からのヌクレオチド配列と EST クローン W27666 のそれに一致するヌクレオチド配列を有する EST とを用いて、mRNA 分子の全配列を予測した。予測分子の 5' - 末端の配列と 3' - 末端の配列とに一致するプライマーを使用して、2.3 kb 長 cDNA を RT-PCR プロトコールによって増幅した。増幅した cDNA はベクターにクローン化してその配列を決定した。得られた cDNA の大部分は、52800.28Da の予測分子量を有する 465 個のアミノ酸からなるタンパク質をコードしている (配列表の配列番号 1)。

30

また、このタンパク質の細胞内での局在を、特異的な抗体で間接免疫蛍光染色することによって可視化したところ、このタンパク質は核中に局在していることが判明した。更に、大きな固まり状の染色が核中に検出された。抗ヌクレオリン抗体による二重染色では、これらの点が核小体と一致していることが示された。GFP 融合 mina53 タンパク質を細胞に発現したときにも、この融合タンパク質が核ならびに核小体に蓄積されることが観察された。これらの結果は、Mina53 が核質ならびに核小体に局在している核タンパク質であることを示している。

40

464 個のアミノ酸からなるタンパク質をコードする cDNA (52672.15Da の予測分子量を有する) もクローン化した。このタンパク質には主タンパク質の 297Q が欠失している。また 101bp が mina53 cDNA の中央部に挿入された cDNA も検出された。挿入配列中に停止コドンがあり、この cDNA は Mina53 タンパク質の 1-262 個のアミノ酸と、18 個の新規なアミノ酸とをコードしている。この mRNA の量は少ないけれども、この mRNA 分子は、ヒト赤白血球腫瘍細胞株 (HEL)、卵巣ムチン様嚢胞腺がん細胞株 (MCAS)、ならびに結腸腺がん細胞株 (Widr) から作成した cDNA ライブラリー中に検出された。

Mina53 がヒト、ラット、マウスに保存されていることについて調べた結果、min

50

a 5 3 のオルソローガス遺伝子であると思われるマウス c D N A が B l a s t サーチ (G e n B a n k A c c : N M _ 0 2 5 9 1 0) によって見出された。この配列を基にして R T - P C R プロトコルによってマウス m i n a 5 3 c D N A を単離した。この配列は (G e n B a n k A c c : N M _ 0 2 5 9 1 0) のものとは塩基配列が異なっており、アミノ酸配列も 2 つ異なっていた (配列表の配列番号 2) 。また、3 0 0 b p 長を有し、マウスとヒトの m i n a 5 3 の 3' - 非翻訳領域に相同するラット E S T (G e n B a n k A c c : H 3 2 9 3 3) も見出された。ラット m i n a 5 3 m R N A を増幅すると、予測されたプライマーを使用した R T - P C R プロトコルによってラット m i n a 5 3 c D N A を単離した (配列表の配列番号 3) 。ラットならびにマウス m i n a 5 3 のオープンリーディングフレーム (O R F) は 4 6 5 個のアミノ酸からなるタンパク質をコードしている。ラットならびにマウス m i n a 5 3 タンパク質のアミノ酸配列は 8 6 % が互いに一致していて、ヒトならびにマウス M i n a 5 3 タンパク質のそれは 7 2 % が一致していて、ヒトとラット M i n a 5 3 のそれとは 7 5 % 一致していた。このことは、m i n a 5 3 が哺乳動物に保存されていることを示している。メチオニン開始コドンの 3 b p 上流のヌクレオチドは、3 種全ての m i n a 5 3 中において “ A ” であり、コザック・コンセンサス配列に一致している。ラット m i n a 5 3 遺伝子やマウス m i n a 5 3 遺伝子も、ヒト m i n a 5 3 遺伝子と同様に細胞増殖のメカニズム解明に役立ち、がん細胞の診断法などの研究にも有用である。

上記実施例において、m i n a 5 3 m R N A の発現についてノーザンプロット分析によって調べた m i n a 5 3 m R N A の発現状況を図 2 に示す。

図 2 A は、m i n a 5 3 m R N A の発現レベルが T 9 8 G 細胞中の c - m y c 発現レベルと関連していることを示している。血清飢餓状態の T 9 8 G 細胞を最終濃度が 1 0 % になるように血清を添加して刺激した。R N A を所定の時間に単離し、同量の R N A をノーザンプロット法によって分析して m i n a 5 3 と c - m y c m R N A とを検出した (図 2 A の左側の泳動図) 。電気泳動した 2 8 S と 1 8 S リボソーム R N A を電気泳動した図は、加えた R N A がほぼ同じ量であることを示している。検出された m R N A を定量しプロットした (図 2 A の右側のグラフ) 。これらの結果は、m i n a 5 3 m R N A の発現が 5 倍増加したことを示している。この増加は血清添加後 6 時間して検出できるようになり、1 2 時間後に最大になった。c - m y c m R N A 発現量は、血清添加後 3 時間して検出できるようになり、1 2 時間して最大となった。これらの結果は、c - m y c m R N A の発現上昇に引き続き、m i n a 5 3 m R N A の発現上昇が起こることを示唆している。

図 2 B は、ヒト前骨髄性白血病細胞 H L 6 0 において、m i n a 5 3 m R N A の発現レベルの低下と c - m y c m R N A の消滅とが平行的な関係があることを示している。H L 6 0 細胞を T P A で分化すると、c - m y c の発現レベルが減少する。この実験系を使用して、M y c 標的遺伝子が、血球細胞分化を伴う M y c の発現低下によって影響されるかどうかを調べた。この実験では、ヒト前骨髄性白血病細胞 H L 6 0 を T P A 1 0 n M に接触させて所定の時点で R N A を単離し、同量の R N A をノーザンプロット分析によって分析して、m i n a 5 3 と、c - m y c と、C D 1 8 m R N A とを検出した (図 2 B の左側の泳動図) 。更に、それぞれの m R N A を定量してプロットした (図 2 B の右側のグラフ) 。

その結果、H L 6 0 細胞を T P A 1 0 n M で培養後 9 時間して、分化マーカー C D 1 8 の発現が増加し始めて、誘発発現量が 2 4 時間目に 3 倍になったことが観察され、この系中で分化が確認された。T P A 添加 3 時間後、c - m y c m R N A レベルが低下し始めて、7 時間後に 5 分の 1 になった。c - m y c m R N A の低下に引き続いて、m i n a 5 3 m R N A の低下が連続して起こり、m i n a 5 3 m R N A レベルが 1 2 時間後に 5 分の 1 になった。これらの実験から、m i n a 5 3 の発現パターンが c - m y c の発現と因果関係があることが示された。

次に、c - M y c 活性化の m i n a 5 3 に対する効果を調べた。図 2 C は、c - M y c E R タンパク質を発現する T 9 8 G 細胞 (T 9 8 G m y c e r - 2 細胞) における m i n a 5 3 m R N A の誘発状態を示している。ここでは、T 9 8 G m y c e r - 2 細胞と親 T 9 8 G 細胞とを 0.25 % 血清添加培地で 4 0 分間 4 0 時間培養した後、O H T 2 0 0 n M で処理し、R N A を所定の時間に単離した。図中、符号 + は、O H T 添加 2 0 分前にシクロヘキシミド (C H X) 2 0 . μ g / m

10

20

30

40

50

Iを添加したことを示している。同量のRNAをノーザンブロット法による分析によって *mina53* mRNAが検出された(図2Cの左側の泳動図)。検出されたmRNAを定量しプロットした(図2Cの右側のグラフ)。

図2Cに示すように、OHTで処理したT98Gmycer-2細胞中では、*mina53* mRNAのレベルは9時間一定して上昇し、誘発発現量がほとんど3倍ほど増加した。これに対して、T98G親細胞をOHTで処理しても*mina53* mRNAレベルの刺激は上昇しなかった。OHTによるT98Gmycer-2細胞中での*mina53* mRNAの誘発発現誘導はタンパク質合成インヒビターであるシクロヘキシミドの存在下でも維持された。一方、シクロヘキシミドで処理しても、T98G親細胞に対しては*mina53* mRNAレベルに対する効果はほとんど無かった。これらの結果は、*mina53* 遺伝子がMycの直接の標的であることを示している。

10

Mycの活性化による*Mina53*タンパク質の発現誘導を図3を参照して説明する。図3は、特異的な抗体を使用した*Mina53*タンパク質のウェスタンブロッティング分析を示す図である。まず、図3Aを参照して、Mycの活性化による*Mina53*タンパク質の発現上昇を説明する。T98GおよびT98Gmycer-2細胞をOHT200nMの存在下もしくは不存在下で20時間培養した。ヒト*Mina53*タンパク質に対する特定の特異的な抗体を使用したウェスタンブロッティングにより*Mina53*タンパク質を分析した(左側パネル)。HL60細胞を、TPA10nMの存在下もしくは不存在下で20時間培養して、ヒト*Mina53*タンパク質に対する特異的な抗体と、抗*c-Myc*抗体に対する特異的な抗体とを使用したウェスタンブロッティングによりTPA10nMの存在下もしくは不存在下で20時間培養した(右側パネル)。タンパク質の染色に対するプロファイルも示した(下側パネル)。

20

かかる特定の特異的な抗体を使用したウェスタンブロッティングによって、アミノ酸配列から予測されたのと同じ移動度を有するバンドをT98G細胞とHL60細胞とにおいて検出した(図3A)。*Mina53*のバンド強度は、*c-Myc* ERがT98Gmycer-2細胞中でOHTによって活性化されたときに増加した。HL60細胞をTPA10nMの存在下で20時間培養した後、*c-Myc*と*Mina53*タンパク質との発現は減少した。

図3Bに示すように、ヒト*c-Myc*と、その活性化ドメイン(TAD)の大部分を欠失している変異*c-Myc*をコードする発現ベクターと、空のベクターとをラット3Y1繊維芽細胞中に導入して安定して発現する細胞株を確立した。3Y1MycAと3Y1MycBとは野生型ヒト*c-Myc*を保持発現していて、3Y1Myc(dTAD)Aと3Y1Myc(dTAD)BとはTAD欠失*c-Myc*を保持発現していて、3Y1ベクターは空のベクターを保持している。抗*Mina53*抗体(上側パネル)と抗*c-Myc*抗体(中間パネル)とを使用してウェスタンブロッティングによってタンパク質を分析した。通常の染色法によるタンパク質のプロファイルも示した(下側パネル)。

30

Mycによる*Mina53*の発現制御は、ラット繊維芽細胞株3Y1中で確認された(図3B)。ヒト*c-Myc*を3Y1細胞に安定して導入したとき、*Mina53*の発現は、*c-Myc*発現を用量依存的に増加した(3Y1、3Y1ベクター、3Y1MycAおよび3Y1MycBに対するレーンを比較)。また、転写活性化ドメイン(TAD)が欠失している*c-Myc*突然変異体を3Y1細胞に導入したMyc突然変異体においては、野生型*c-Myc*の発現に匹敵するレベルで*Mina53*を発現したときには(3Y1MycAと3Y1Myc(dTAD)Aとを比較)、*Mina53*の発現は増加しなかった。Myc突然変異体が野生型*c-Myc*の発現よりも遥かに高いレベルで発現しても(3Y1ベクター、3Y1MycBおよび3Y1Myc(dTAD)Bのレーンを比較)、*Mina53*の発現は増加しなかった。これらの結果から、*c-Myc*が*mina53*の発現を*c-Myc*の転写活性化ドメイン(TAD)を使って活性化していることを示している。

40

図1Aは、ヒト*mina53*遺伝子の構造の概略を示している。図中、ボックスはエクソンを示し、閉鎖部はオープンリーディングフレーム(ORF)を示し、開放部は5'未翻訳領域と3'未翻訳領域を示す。ヒト*mina53*遺伝子は12個のエクソンから構成されていて、2個の転写開始部位としてエクソン1aと1bが存在する。転写方向は左側か

50

ら右側であり、転写はエクソン 1 a またはエクソン 1 b から開始する。エクソン 1 b は、エクソン 1 a の 0.25 kb 下流に存在する。翻訳開始部位はエクソン 2 に存在する。停止コドン (TAG) はエクソン 10 に存在する。464 個のアミノ酸 (297 Q を欠失している) をコードする cDNA はエクソン 7 の最初の 3 bp が欠失している。エクソン 5 とエクソン 6 との間に存在するエクソン 5' は、主 cDNA の中央部に挿入された 101 bp の配列をコードしている。

mina53 cDNA 配列を含むヒトゲノミック DNA 配列は HTGS (GenBankAcc:AC026100, AC073245, AC024892) 中に見出すことができる。イントロン 2 (エクソン 2 とエクソン 3 との間) の長さは GenBank のデータと異なっていたので、エクソン 2 とエクソン 3 中の配列に対応するオリゴヌクレオチドをプライマーとして用いて PCR で増幅し、その長さを 5.2 kb であることを決定した。UCS Genome Browser のマッピングデータは、mina53 遺伝子が第 3 番染色体 (3q12.1) にマップされていることを示している。

図 1 B は、エクソン 1 b が 2 個の E-ボックス (CACGTG エlement) を有していることを示している。これら 2 個の E-ボックスの 1 番目と 2 番目とをそれぞれ E-ボックス 1 と E-ボックス 2 と命名した。

mina53 遺伝子のプロモータ活性を調べるために、エクソン 1 a から上流の領域と、エクソン 1 a と、エクソン 1 b と、イントロン 1 の 1 部とを含むヒト mina53 ゲノミック DNA フラグメントをファイアフライ・ルシフェラーゼ (firefly luciferase) cDNA に結合して、レポータープラスミド、pMina(W)luci を構築した (図 1 B)。図中、pMina(dE)luci は 2 つの E-ボックスを持つ部分を欠損させたレポータープラスミドを、pMina(mE1/2)luci は 2 個の E-ボックスに変異を導入したレポータープラスミドを、pMina(mE1)luci は E-ボックス 1 に変異を導入したレポータープラスミドを、pMina(mE2)luci は E-ボックス 2 に変異を導入したレポータープラスミドを示している。

図 1 C は、T98G 細胞中でのトランジェント発現アッセイによって、DNA フラグメントがプロモータ活性を有していることを示している。

c-MycER を OHT によって活性化すると、ルシフェラーゼ活性は 3 倍まで増加した。この刺激は、mina53 mRNA に対して観察されたものに匹敵している (図 2 C)。

pMina(W)luci から 2 個の E-ボックスを除去したとき、ルシフェラーゼ活性は、c-MycER キメラタンパク質 (図 2 C、pMina(W)luci のデータ) を活性化しても増加しなかった。その 2 個の E-ボックスを CACGTG から CACCTG に変異した pMina(mE1/2)luci からの発現は c-Myc の活性化によっても増加しなかった。これらの結果は、pMina(W)luci の発現が CACGTG エlement によって刺激 E-ボックスを介して活性化されることを示している。

どちらの E-ボックス CACGTG エlement が機能的であるかを決定するために、それぞれの E-ボックスの配列を CACGTG から CACCTG に変異した異なる CACGTG エlement を有するレポータープラスミド pMina(Em1)luci と pMina(mE2)luci とをそれぞれ構築した (図 1 B)。図 1 C に示すように、E-ボックス 1 の変異による効果はほとんど無かった。他方、E-ボックス 2 を変異した場合、c-Myc による刺激は著しく低下した。これらの結果は、c-Myc が E-ボックス 2 を介して機能していることを示している。

HL60 細胞が増殖応答している間 c-Myc タンパク質がインビボ (in vivo) で内因性 mina53 遺伝子に結合することを調べるために、文献記載の方法によってクロマチン免疫沈降 (ChIP) を行なった (Boyd, K.E., et al.: (1997) Mol. Cell. Biol. 17, 2529-2537; Boyd, K.E., et al.: (1998) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 13887-13892)。抗 c-Myc 抗体で免疫沈降後、各サンプル中の内因性 mina53 遺伝子フラグメントを PCR でモニターし、mina53 遺伝子中のエクソン 1 b とイントロン 1 の部分を特異的に増幅した。

図 4 に示すように、2 個の異なる抗 c-Myc 抗体は、増殖期の HL60 細胞から min

10

20

30

40

50

a 5 3 遺伝子を免疫沈降したが、T P A と共に培養すると、H L 6 0 からは m i n a 5 3 遺伝子断片が免疫沈降されなかった。また、m i n a 5 3 ゲノミック D N A フラグメントを精製し検出した場合、非特異的抗体が m i n a 5 3 D N A フラグメントを免疫沈降しなかったので、m i n a 5 3 遺伝子に結合する c - M y c に依存していることが確認された。更に、染色体 2 2 中の検出可能な遺伝子がいずれもない染色体領域に位置している E - ボックス近傍のゲノムフラグメントは、c - M y c に対する抗体によって免疫沈降しなかったので、m i n a 5 3 遺伝子で検出された結合は特異的であることが確認できた。これらの結果は、増殖期の H L 6 0 細胞中において、c - M y c が m i n a 5 3 遺伝子に特異的に結合していることを示している。

以下、M i n a 5 3 が H e L a 細胞の増殖と、c - M y c を著しく発現する 3 Y 1 細胞との増殖に参与していることを図 5 を参照して説明する。

m i n a 5 3 の生物学的機能を調べるために、上述したように、s i R N A 二本鎖を使用して M i n a 5 3 タンパク質の発現を特異的に阻害し、s i R N A を導入して 4 0 時間後 M i n a 5 3 タンパク質をモニターした。

図 5 A で示すように、M i n a 5 3 タンパク質の発現は、ヒト細胞株である H e L a 細胞中においてヒト m i n a 5 3 に特異的な s i R N A 二本鎖によって特異的に減少した。これに対して、非特異的な s i R N A、つまり、m i n a 5 3 とは逆方向の配列を有する二本鎖（コントロール）と、ラット m i n a 5 3 に特異的な二本鎖によっては、M i n a 5 3 タンパク質の発現は減少しなかった。つまり、M i n a 5 3 タンパク質の発現は、c - M y c を著しく発現するラット 3 Y 1 細胞（3Y1MycB）においてはラット m i n a 5 3 に特異的な s i R N A 二本鎖によって特異的に減少するのに対して、コントロールとしての s i R N A とヒト m i n a 5 3 に特異的な二本鎖によっては減少しなかった。

図 5 B に示すように、M i n a 5 3 の発現が減少したときには、細胞増殖は非常に抑制される。つまり、H e L a 細胞と 3Y1MycB 細胞の増殖はヒトならびにラット M i n a 5 3 それぞれに特異的な s i R N A 二本鎖の導入によってほとんど完全に停止する。

また、この発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体は、タンパク質 M i n a 5 3 の発現をウェスタンブロットング分析で調べたところ、白血病細胞株 H L 6 0 を用いたウェスタンブロットング分析によって、分子量 5 3 k D a の単一バンドを認識することができることを示した（図 6 A、レーン 1）。また、上記抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いた免疫ブロットング分析によって、T P A で細胞を処理しても、5 3 k D a のバンドのシグナルが減少した（図 6 A、レーン 2）。これに対して、T P A 処理によっては - アクチンの発現は実質的には減少されないという特異性が確認された（図 6 A、レーン 1、2）。

他方、H e L a 細胞中に発現させたグリーン蛍光タンパク質（G F P）に細胞融合させたタンパク質を用いた別の実験においては、この抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体が、内在性タンパク質 M i n a 5 3 に加えて、H e L a 細胞中に発現させたグリーン蛍光タンパク質（G F P）に細胞融合させたタンパク質 M i n a 5 3 についても単一バンドを発生した。

更に、この発明に係る抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体を用いた免疫ブロットング分析によって、3 種類の増殖期の大腸がん細胞株 H T - 2 9、W i D r および S W - 6 2 0 を用いて、大腸がん細胞株におけるヒトタンパク質 M i n a 5 3 の発現を調べた結果、抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体は、3 種類すべての細胞株において 5 3 k D a の単一バンドを認識した（図 6 A、レーン 3 - 5）。このことは、これらの細胞株がタンパク質 M i n a 5 3 を発現し、抗 M i n a 5 3 モノクローナル抗体が、他のタンパク質と交差反応せず大腸がん細胞中のタンパク質 M i n a 5 3 を特異的に認識していることを示している。

一方、これらの細胞株におけるタンパク質 M i n a 5 3 の発現レベルは、T P A によって実験的に減少させた H L 6 0 細胞中のタンパク質 M i n a 5 3 の発現レベルよりもより一層高かった（図 6 A、レーン 2 - 5）。他方、上記 3 種類の大腸がん細胞株におけるアクチンレベルは、T P A 処理した H L 6 0 細胞のアクチンレベルよりも高くはなかった。こ

10

20

30

40

50

これらの結果は、上記3種類の大腸がん細胞株が最終的に分化したHL60細胞よりも比較的高いレベルのタンパク質Mina53を含んでいることを示唆している。

その上、抗Mina53モノクローナル抗体と抗ヌクレオリンラビット抗体とを用いた二重細胞免疫蛍光染色法によって、大腸がん細胞内におけるタンパク質Mina53の局在状態を調べたところ、抗Mina53モノクローナル抗体は、細胞SW-620内の核を特異的に染色するとともに、その核質内の核小体に、ヌクレオリンに対するシグナルと重複する強力な点状の染色を示した。その他の2種類の細胞株も同一の免疫蛍光染色パターンを示した。これらの結果から、タンパク質Mina53は、本発明者らがHeLa細胞についてすでに示したように(Tsuneoka, M., et al., *ibid*)、核小体に凝縮した状態で核内に局在していることを示している。

10

(大腸がん組織内におけるタンパク質Mina53の発現)

この発明の抗Mina53モノクローナル抗体を使用して、大腸がん組織内のタンパク質Mina53を検出するとともに、HE染色法を使ってがん領域を識別した。図7Aに示す切片には中程度に分化した大腸がん細胞が含まれていた。図7Bに示すように、がん領域内のタンパク質Mina53は顕著に染色されているのに対し、腫瘍周辺の非腫瘍上皮細胞はほとんど染色されていなかった。染色は、主に核内に見出され(図7EおよびF)、さらに大腸がん細胞株において得られた結果(図7B)と同様のパターンを示す点状の染色(おそらく核小体)が見出された。該抗体を使用せずに切片を培養したとき(図7D)または過剰量の組換えタンパク質Mina53の存在下で培養したときには、この核内の染色は認められなかった。がん組織の切片のいくつかでは、がん細胞が主ながん領域から離れて局在する上皮細胞の直下のリンパ管内に見出された。この発明に係る抗Mina53モノクローナル抗体は、これらのがん細胞を顕著に染色したのに対して、その周囲の非がん細胞をわずかに染色しただけであった(図8A)。また、大腸の深層にあるリンパ腺中に侵入した細胞も、タンパク質Mina53に対して強い免疫反応を示していたのに対して、その周囲の非腫瘍性細胞は染色されていなかった(図8B)。更に、抗Mina53モノクローナル抗体は、深部に侵入した腫瘍を染色するとともに(図8C)、繊維間質内のほとんど分化していない腫瘍細胞を識別しているのに対して(図8C)、これら腫瘍細胞周囲の非腫瘍細胞を染色しなかった。これらの結果は、浸潤したりまたは転移した腫瘍中にもタンパク質Mina53が高発現されていることを示している。

20

(大腸がんの組織病理学的等級におけるタンパク質Mina53の発現)

30

大腸腺がん患者と、腺腫患者からの標品中にタンパク質Mina53を免疫組織化学的染色法によって検出した。その概要は表1に示している。表1に示すように、タンパク質Mina53は、大腸がんのすべての組織病理学的等級において発現しており、つまり、十分に分化した腫瘍(図9A)、中程度に分化した腫瘍(図7B)およびあまり分化していない腫瘍(図2F)のいずれにおいても顕著に染色されていた。また、それらの平均染色インデックスはそれぞれ2.28、1.78および1.85であった(表1)。これらの結果は、十分に分化した腫瘍は中程度に分化した腫瘍やあまり分化していない腫瘍に比べてより高い染色強度を示す傾向がわずかにあるけれども、腫瘍の病理学的等級と染色強度との間には因果関係がないことを示唆している。更に、タンパク質Mina53は腺腫において高発現されることから(図9C)、タンパク質Mina53の発現上昇は、大腸がん発生の一般

40

的かつ比較的初期の事象であることを示唆している。その上、染色はすべての場合において核に限られている(図7Eおよび図7F)。要約すると、この発明に係る抗Mina53モノクローナル抗体を使用して大腸がん細胞株と大腸がん組織中におけるタンパク質Mina53の発現を調べたところ、調べた3種類の大腸がん細胞株でMina53の顕著な発現が認められ、また、調べたほとんどすべての大腸がん組織においてMina53の発現上昇が認められた。また、タンパク質Mina53は、いずれの組織病理学的等級の大腸がん、つまり、十分に分化した等級、中程度に分化した等級ならびにあまり分化していない等級の腫瘍において発現したのに対して、ほとんどの非がん細胞においてはMina53に対する染色はほとんどもしくは全く認められなかった。更に、がん細胞におけるMina53発現の上昇は、がん細胞の場所に

50

無関係に観察された。換言すれば、原発腫瘍、浸潤性腫瘍、リンパ管侵入ならびに隔離腫瘍細胞において、タンパク質Mina53に対して著しい染色が観察された。

表1:

患者 no.	組織 学的 等級	染色がん細胞の 割合 (%)		染色強度		染色インデックス	
		Mina53	Ki-67	Mina5	Ki67	Mina53	Ki-67
				3			
1	低	84.5	46.2	1	1	0.85	0.46
2	低	86.3	63.2	3	3	2.91	2.44
3	低	79.6	88.9	2	3	1.59	2.67
	*)	100.0	96.3	2	2	2.00	1.93
	**)	0	31.9	0	2	0.00	0.64
4	低	94.2	52.4	2	3	1.89	1.57
5	低	100.0	100	2	3	2.00	3.00
6	中	94.3	81.6	2	2	1.89	1.63
7	中	100.0	76.2	3	3	3.00	2.29
8	中	97.5	87.4	2	3	1.95	2.62
9	中	100.0	83.6	1	3	1.00	2.50
10	中	92.4	75.0	2	2	1.85	1.50
11	中	79.2	62.1	2	2	1.58	1.24
12	中	89.0	54.2	1	2	0.89	1.08
13	中	100.0	60.1	1	3	1.00	1.80
14	中	95.5	84.8	3	3	2.87	2.54
15	高	80.1	72.9	2	2	1.60	1.46
16	高	100.0	63.5	2	2	2.00	1.27
17	高	93.8	50.0	3	2	2.81	1.00
18	高	100.0	100.0	3	3	3.00	3.00
19	高	92.7	84.6	2	3	1.85	2.54
20	高	78.7	74.0	2	3	1.57	2.22
21	高	98.9	57.0	2	3	1.98	1.71
22	高	92.7	43.1	3	3	2.78	1.29
23	高	98.3	80.0	3	3	2.95	2.40
24	腺腫	90.0	42.6	3	2	3.00	0.85

*) ムチン様腺がん細胞が含まれていた。

***) このがんは脾臓の胞状細胞がんに類似した形態を有していた。

)

連続切片を抗Ki-67モノクローナル抗体(MIB1)を用いて染色して、抗Mina53モノクローナル抗体での染色パターンと比較した。すでに報告されているように(Cattoretti, G., et al.: J Pathol 1992, 168:357-563; Jansson, A, Sun, X.F.: APMIS 1997, 105:730-734; Saarnio, J., et al.: Am J Pathol 1998, 153:279-285)、抗Ki-67モノクローナル抗体と抗Mina53モノクローナル抗体とは大腸がん細胞を強力に染色した(図7C、9B)。ほとんどの場合において、Ki-67とMina53に対する抗体は、図7B、図8C、図9Aならびに図9Bおよび表1と同様に、がん細胞を染色した。

顕微鏡視野内における染色細胞の割合をKi-67とMina53について調べたところ、両者に対する抗体の間には違いが見出され、大部分の場合においては、Mina53を発現している細胞の割合は、Ki-67を発現している細胞の割合よりも多かった(図9A、B)。これに対して、2、3の場合においては、Mina53を発現している細胞の割合がKi-67を発現している細胞の割合と同様であった(表1)。

なお、一つの場合(患者番号3)においては、調べた切片は3種類の異なる形のがんを含んでいたため、複雑な染色パターンが得られた。あまり分化していない上皮がん細胞とムチン様腺がん細胞を有する2つの領域では、タンパク質Mina53とKi-67との両者に対して陽性の細胞の割合は同様に高かった(表1)。これに対して、第3の領域においては、腫瘍は、膵臓の小葉がん類似した形態学的構造を有して、抗Mina53モノクローナル抗体によってはほんのわずかしが染色されなかったのに対して、抗Ki-67モノクローナル抗体によっては強力に染色された。しかしながら、陽性の細胞の割合は上記2つの領域と比較して低かった(表1)。腺腫の場合には、形成異常の領域内のほとんどすべての細胞は抗Mina53抗体によって強く染色されているのに対して、抗Ki-67抗体によっては抗Mina53抗体の場合程高率には細胞が染色されてなかった(図9C、D)。わずかな例外があるけれども、これらの結果は、Mina53を発現する細胞の割合がKi-67を発現する細胞の割合よりも特徴的に高いことを示唆している。

(非腫瘍大腸組織におけるタンパク質Mina53とKi-67との間の染色パターンの比較)

非腫瘍大腸組織のある領域においては、Ki-67に対する抗体は細胞を強力に染色していたのに対して、Mina53に対する抗体はそれらの細胞を非常に弱くしか染色していなかった。抗Ki-67抗体による染色は、活発に増殖をしていると思われる腺窩の下部3分の1の部分に存在する細胞の核内において観察された(図9F)。また、非腫瘍大腸組織の腺窩における染色強度は、がん領域において見出された細胞とは実質的には異なっていなかった(図9B、F)。他方、抗Mina53モノクローナル抗体は、これらの細胞の核をわずかにしか染色せず、その染色強度はがん領域中に見出された細胞よりも一層弱いものであった(図9A、E)。更に、高い有糸分裂活性を有する細胞を含むリンパ濾胞の胚中心は、Ki-67に対する抗体によって強力に染色されたけれども、抗Mina53モノクローナル抗体によっては非常に弱くしか染色されなかった(図9G、H)。

上記の結果から、細胞増殖マーカーとして繁用されているKi-67に比較して、がん細胞は、タンパク質Mina53をより高い割合で発現することが確認された。Ki-67に対する抗体は、下部腺窩ならびにリンパ濾胞の胚中心の細胞を含む、がん細胞ならびにある種の十分に増殖している正常細胞を強力に染色した。他方、Mina53に対する抗体はこれらの非腫瘍領域中の細胞を稀にしか染色しなかった。

これらの結果は、Mina53の高発現を大腸がんの典型的な特長と見なすことができることを示している。したがって、Mina53の発現は大腸がんに対するマーカーとして使用することができるとともに、正常組織に浸潤したがん細胞を見出すのにも有用であると考えられる。それに加えて、タンパク質Mina53に対する染色は予後のマーカーとしても有用であると考えられる。

60%以上の大腸がんにおいて、がん発生の初期から、APC遺伝子内の体性突然変異が見出される(Miyoshi, Y., et al.: Hum Mol Genet 1992, 1:229-233; Powell, S.M., et al.: Na

10

20

30

40

50

ture 1992,359:235-237)。また、カテニンの突然変異は、A P C突然変異が欠如している大腸腫瘍中に見出されている (Morin,P.J.,et al.:Science 1997,275:1787-1790;Sparks,A.B.,et al.:Cancer Res 1998,58:1130-1134)。A P Cタンパク質の主要な機能は、グリコゲンシンターゼキナーゼ3 (GSK-3)とアクシントタンパク質と連携した遊離カテニン量の調節であると考えられている (Hinoi,T.,et al.:J Biol Chem 2000,275:34399-34406)。A P Cの機能損失、アクシンの不活性化 (Behrens,J.,et al.:Science 1998,280:596-599)またはカテニンを活性化する突然変異 (Polakis,P.:Curr Opin Genet Dev 1999,9:15-21)は、カテニンの細胞内蓄積をもたらすことになり、核に転位したときには、幾種類かの特異的な標的遺伝子の発現を増加することになるT細胞因子 (Tcf)依存転写のアクティベーターとして有用である (Roose,J.,Clevers,H.:Biochim Biophys Acta 1999,1424:M23-M37)。

最近、A P C経路の標的としてのc-mycが同定され、c-mycがA P C遺伝子の機能損失によってまたはカテニンの過剰発現によって惹起されることが示された (He,T.C.,et al.:ibid)。したがって、A P Cもしくはアクシンの不活性化による突然変異またはカテニンの活性化による突然変異は、c-mycの過剰発現を導くことになり、その結果Mina53の発現が高くなるものと考えられる。したがって、Mina53は、大腸がん発生に関係しているA P C / カテニン経路の下流の間接標的であると思われる。これらの結果は、Mina53の高発現が大腸がんの典型的な特長と見なすことができることを示している。したがって、Mina53の発現は、大腸がんに対するマーカーとして使用できるとともに、正常組織に浸潤したがん細胞を見出すのに有用であると考えられる。それに加えて、Mina53の染色は予後のマーカーとしても有用であると考えられる。

その上、タンパク質Mina53の発現パターンを、細胞増殖のバイオマーカーとして広く使用されているKi-67の発現パターンと比較すると、ほとんどのがん組織において、Mina53を発現している細胞の割合が、Ki-67を発現している細胞の割合よりも特長的に高いことが判明した (表1)。このことは、遺伝子Mina53がMyc標的遺伝子であるという事実に基づいていると思われる。c-mycは、増殖細胞の細胞サイクルのいずれの相中においても連続的に発現している (Rabbitts,P.H.,et al.:EMBO J 1985,4:2009-2015;Waitz,W.,Loidl,P.:Oncogene 1991,6:29-35)。これに対して、Ki-67は、後期G1相、S相、M相およびG2相の増殖中の細胞内で優先的に発現している (Gerdes,J.,et al.:Int J Cancer 1983,31:13-20;Gerdes,J.,et al.:J Immunol 1984,133:1710-1715)。Mina53は、c-mycによって生起されるので、Mina53ががん組織中においてKi-67よりもより広範に発現されていることは理屈に合っている。十分に生育した腺窩における細胞は、Ki-67に対する抗体によって強く染色されたのに対して、タンパク質Mina53に対する抗体によっては弱くしか染色されなかった。また、非腫瘍性であるが増殖している細胞を含むリンパ濾胞の胚中心内の細胞は、抗Mina53抗体によって弱くしか染色されないが、抗Ki-67抗体によって強く染色された。本発明者らは、c-mycが高度に発現している2種類の培養した細胞株、つまりヒト子宮頸がんHeLa細胞ならびにラット線維芽細胞における細胞増殖のためMina53が重要な因子であることをすでに示している (Tsuneoka,M.,et al.:ibid)。従って、タンパク質Mina53は、いくつかの限られたタイプの細胞においてだけ細胞増殖のために重要な役割を果たしているのかもしれない。あるいは、腺窩ならびにリンパ濾胞の胚中心の正常細胞は、より少ない量のMina53で増殖するかまたはタンパク質Mina53と同様の機能を有する別のタンパク質を発現している可能性がある。いずれの場合でも、がんでない細胞に比べてがん細胞が抗Mina53抗体によって強力に染色されるので、Mina53はがん発生との関係を有していると考えられる。

更に、食道がん組織を、抗Mina53モノクローナル抗体によって染色して得られた染色インデックスを、ヒト食道がんを染色するために現在使用されている抗Ki-67モノクローナル抗体によって染色して得られた染色インデックスと比較したところ、その染色程度には相関が見られたけれども、明らかな違いが認められた。つまり、図13に示すよ

10

20

30

40

50

うに、抗Ki-67モノクローナル抗体による染色程度が高いものでは、ほとんど抗Mina53モノクローナル抗体の染色程度が高かった。これに対して、抗Ki-67モノクローナル抗体による染色程度がほとんど見られないものでも、抗Mina53モノクローナル抗体の染色程度が高いものがあった。このことは、抗Mina53モノクローナル抗体が抗Ki-67モノクローナル抗体よりも食道がん組織をよく染色することを示している。

次に、食道がんの手術後の生存月数とMina53の染色インデックスとKi-67の染色インデックスとの間に相関関係が見られるかを、生存月数が確認できる33例について調べたところ、図12に示すように、生存月数とMina53の染色インデックスの間には明らかな相関関係が認められた($p < 0.011$)。これに対して、Ki-67ではそのような相関関係は認められなかった。

そこで、食道がん患者をMina53発現が高いグループと低いグループの2つに分け、それぞれのグループを Kaplan-Meier 法により解析したところ、図12(A)の結果に示すように、2つのグループでは累積生存率に明らかな相違が認められた。これに対して、Ki-67についても同様の解析を行ったところ、図12(B)に示すように、Mina53のようなハッキリとした違いは認められなかった。そこで、食道がん患者の手術後の生存月数とMina53の染色インデックスあるいはKi-67の染色インデックスとの関係を表2に示す。

表2:

	例数	相関	p値
Mina53	33	-0.436	0.0104
Ki-67	33	-0.83	0.6499

上記の結果から、Mina53モノクローナル抗体による染色程度は食道がんの悪性度と関係することが示唆しているものと考えられる。

また、タンパク質Mina53のアミノ酸配列の128から271の領域にJmjCドメインという部分がある(Tsuneoka, M., et al.: *ibid*)。このドメインは、多くの遺伝子の間での配列の類似性に基づいて最近同定されたものであり、JmjCドメインを持つ蛋白質はほとんどの場合DNA結合もしくはクロマチン結合ドメインを持っている(Clissold, P.M., Ponting, C.P.: *Trends Biochem Sci* 2001, 26:7-9)。このJmjCドメインは、クピンフォールド(cupin fold)を採用しているものと予測され、クロマチン再構築を規制する金属酵素の候補である(Clissold, P.M., Ponting, C.P.: *ibid*)。各腫瘍は、そのいずれもが腫瘍を進行させる一連の遺伝子的ならびに遺伝子配列の変化を伴わない変化による独立したプロセスの結果である(Fearnhead, N.S., et al.: *Br Med Bull* 2002, 64:27-43)。

遺伝子配列の変化を伴わない変化の一つであるクロマチン再構築は、遺伝子の発現に影響を及ぼし、がん発生の一因となりうる。Mina53が核内に局在していることは、タンパク質Mina53がクロマチン再構築により腫瘍の進行に関わっている可能性を支持しているように思われる。しかしながら、このことを明らかにするには、クロマチン再構築がMina53の真の機能であるかどうかを決定する必要がある。

がん遺伝子が活性化することが発がんに関連していることはあきらかであるから、かかるがん遺伝子の不活性化を目標としたヒトのがんに対する処置についての薬理的戦略も重要となってくる。かかる戦略に基づいてがん遺伝子を不活性にするように設計された医薬品が開発されがんの処置も一段と発展することが期待される。しかしながら、かかる医薬品を長期間使用すると、その医薬品はまた正常細胞に対しても致命的なシグナル経路を切断することになり、重篤な毒性を及ぼすことも考えられる(Jain, M., et al.: *Science* 2002, 297:102-104)。また、最近の研究によって、mycファミリーのがん遺伝子は、細胞生育の中心的な調節因子と考えられ、それらのがん遺伝子が臓器発達ならびに再生を含む正常な生物学的プロセスにおいても決定的に必要であることが明らかにされてきている(Henriksson, M., Luscher, B.: *Adv Cancer Res* 1996:109-182; Grandori, C., et al.: *Annu Rev C*

10

20

30

40

50

ell Dev Biol 2000,16:653-699;Luscher,B.:Gene 2001,277:1-14;Stanton,B.R.,et al.:Genes Dev 1992,6:2235-2247;Sawai,S,et al.:Development 1993,117:1445-1455)。上述したように、c - m y c は様々な遺伝子の発現を調節し、特異的なM y c 標的遺伝子はM y c のそれぞれの機能において実質的な役割を果たしているものと考えられる。

産業上の利用可能性

この発明によって同定したc - M y c によって調節される新規ながん関連遺伝子m i n a 5 3 は、がん遺伝子m y c によって直接発現調節されていること、核に存在する分子量5万3千のタンパク質M i n a 5 3 をコードしていること、細胞増殖に関連していること、がん組織において特異的に発現が上昇していること、などによってがん関連分野において種々の応用が可能である。つまり、この発明に係る新規な遺伝子m i n a 5 3 は、がん細胞において特異的に発現が上昇することからがんの診断に応用が可能である。また、がん細胞の増殖抑制がM i n a 5 3 タンパク質の発現を抑制することにより観察されることから、遺伝子治療などによりm i n a 5 3 遺伝子の発現を抑制したり、またはM i n a 5 3 活性を特異的に抑制することができる新薬の開発にも応用できることになる。

また、この発明に係るm i n a 5 3 遺伝子ならびにその産物は、がん細胞などの正常でない細胞の診断およびかかる細胞の増殖を制御することも可能である。

更に、この発明に係る抗M i n a 5 3 モノクローナル抗体によって、ヒト大腸がん細胞においてタンパク質M i n a 5 3 が高発現していること、またヒト大腸がん組織においては正常上皮に比べて原発のがん組織や筋層やリンパ管に侵入していたがん細胞でタンパク質M i n a 5 3 が高発現していることを確認することができる。M i n a 5 3 タンパク質の発現は、細胞増殖マーカーとして繁用されているK i - 6 7 タンパク質の発現と良く似ていて、細胞増殖マーカーとして有効に利用することができるが、がん細胞におけるM i n a 5 3 タンパク質発現に対する陽性細胞の比率はK i - 6 7 タンパク質のものに比べて高いことが確認された。更に、大腸正常上皮の細胞分裂が盛んな領域では、K i - 6 7 の強い発現が見られたのに対し、M i n a 5 3 の発現は高くはなかった。その上、リンパ濾胞の胚中心(正常組織)に強いK i - 6 7 発現が見られたが、M i n a 5 3 発現は高くなかった。これらのことから、M i n a 5 3 タンパク質はK i - 6 7 よりもがん特異性が高いと思われる。

これらの結果から、M i n a 5 3 の発現が大腸がんの初期事象であるとともに、M i n a 5 3 の高発現が大腸がんの典型的な特長と見なすことができることが示されているので、M i n a 5 3 の発現が大腸がんに対するマーカーとして利用することができる。また、M i n a 5 3 の発現を正常組織に浸潤したがん細胞を検出するのにも利用することができるものと考えられる。更に、M i n a 5 3 が染色できることは予後のマーカーとしても有用であると考えられる。

同様に、抗M i n a 5 3 モノクローナル抗体は、食道がん細胞を、現在ヒト食道がん細胞の染色に使用されている抗K i - 6 7 モノクローナル抗体よりもよく染色することを確認した。さらに、抗M i n a 5 3 モノクローナル抗体による食道がん細胞の染色具合によって食道がんの悪性度を診断することも可能である。

この発明に係る抗M i n a 5 3 モノクローナル抗体は、大腸がん、食道がん、舌がん、乳がん、肉腫、脳腫瘍などのがん細胞を良く染色することができることから、M i n a 5 3 を各種がんの診断に利用することも可能である。一方、M i n a 5 3 タンパク質の発現を抑制すると、細胞増殖を強く抑制することができることから、M i n a 5 3 活性を抑えることによってがん治療への応用も可能である。

一方、M i n a 5 3 タンパク質やM i n a 5 3 をコードするm R N A を組織中で検出し、がん細胞などの正常でない細胞を検出して診断に利用することができる。このような場合には、特異的抗体、例えば、ポリクローナル抗体やモノクローナル抗体などのM i n a 5 3 タンパク質に結合する物質や、m i n a 5 3 遺伝子を含む配列を有するR N A 、 D N A などを利用することもできる。

また、この発明においては、組織片に含まれるM i n a 5 3 の発現量を、例えば、ポリクローナル抗体やモノクローナル抗体などのM i n a 5 3 タンパク質に結合する物質を利用

10

20

30

40

50

して、E L I S A法、ウェスタンブロット法もしくは関連手法によって測定することにより、細胞の状態を測定することもできる。更に、m i n a 5 3 遺伝子を含む配列を有するR N A、D N Aなどを利用しても、ノーザンブロッティング法、R N a s e プロテクション法、R T - P C R法、c D N A マイクロアレイ法などの各種測定法によって細胞の状態を診断することもできる。この発明においてはまた血中、尿中などのM i n a 5 3 タンパク質の量を測定することによってもがん細胞を診断をすることが可能である。

更に、M i n a 5 3 タンパク質に対するポリクローナル抗体やモノクローナル抗体などの抗体を利用することにより、当該技術分野において慣用されているE L I S A 法などの手法により体内に存在するがん細胞などの正常状態にない細胞の存在の有無やその量を推定もしくは測定して診断することも可能である。

その上、この発明では、がん細胞などの正常状態にない細胞の増殖を制御することも可能である。M i n a 5 3 活性を抑制するためには、例えば、s i R N A (small RNA interference RNA) 法、アンチセンス核酸法、プロモーターの相同配列の核酸導入法、プロモーターのデコイ法、リボザイム法などを利用することができるとともに、M i n a 5 3 に結合する物資（例えば、抗体などのタンパク質やより低分子の化合物など）も利用することができる。また、M i n a 5 3 のタンパク質や核酸配列に利用しうる物質、例えば、特異的抗体やm i n a 5 3 発現を抑制するs i R N A などや、上記物質を選択するためのスクリーニングなどの方法も利用することができる。

【配列表】

Sequence Listing

<100> Kurume University

<120> Gene mina53 involved in cancer, Protein Mina53 and
Monoclonal Antibody Thereof

<130> JFH15228-PCT

<160> 3

10

<210> 1

<211> 464

<212> DNA

<213> Homo sapiens

<400>1

atg cca aag aaa gca aag cct aca ggg agt ggg aag gaa gag ggg ccg gct ccc
 Met Pro Lys Lys Ala Lys Pro Thr Gly Ser Gly Lys Glu Glu Gly Pro Ala Pro
 5 10 15

20

tgt aag cag atg aag tta gaa gca gct ggg ggg cct tca gct tta aac ttt gac
 Cys Lys Gln Met Lys leu Glu Ala Ala Gly Gly Pro Ser Ala Leu Asn Phe Asp
 20 25 30 35

agt ccc agt agt ctc ttt gaa agt tta atc tgc ccc atc aag aca gag act ttt
 Ser Pro Ser Ser Leu Phe Glu Ser Leu Ile Ser Pro Ile Lys Thr Glu Thr Phe
 40 45 50

ttc aag gaa ttc tgg gag cag aag ccc ctt ctc att cag aga gat gac cct gca
 Phe Lys Glu Phe Trp Glu Gln Lys Pro Leu Leu Ile Gln Arg Asp Asp Pro Ala
 55 60 65 70

ctg gcc aca tac tat ggg tcc ctg ttc aag cta aca gat ctg aag agt ctg tgc
 Leu Ala Thr Tyr Tyr Gly Ser Leu Phe Lys Leu Thr Asp Leu Lys Ser Leu Cys
 75 80 85 90

30

agc cgg ggg atg tac tat gga aga gat gtg aat gtc tgc cgg tgt gtc aat ggg
 Ser Arg Gly Met Tyr Tyr Gly Arg Asp Val Asn Val Cys Arg Cys Val Asn Gly
 95 100 105

aag aag aag gtt tta aat aaa gat ggc aaa gca cac ttt ctt cag ctg aga aaa
 Lys Lys Lys Val Leu Asn Lys Asp Gly Lys Ala His Phe Leu Gln Leu Arg Lys
 110 115 120 125

gat ttt gat cag aaa agg gca acg att cag ttt cac caa cct cag aga ttt aag
 Asp Phe Asp Gln Lys Arg Ala Thr Ile Gln Phe His Gln Pro Gln Arg Phe Lys
 130 135 140

gat gag ctt tgg agg atc cag gag aag ctg gaa tgt tac ttt ggc tcc ttg gtt
 Asp Glu Leu Trp Arg Ile Gln Glu Lys Leu Glu Cys Tyr Phe Gly Ser Leu Val
 145 150 155 160

ggc tcg aat gtg tac ata act ccc gca gga tct cag ggc ctg ccg ccc cat tat
 Gly Ser Asn Val Tyr Ile Thr Pro Ala Gly Ser Gln Gly Leu Pro Pro His Tyr
 165 170 175 180

gat gat gtc gag gtt ttc atc ctg cag ctg gag gga gag aaa cac tgg cgc ctc
 Asp Asp Val Glu Val Phe Ile Leu Gln Leu Glu Gly Glu Lys His Trp Arg Leu
 185 190 195

tac cac ccc act gtg ccc ctg gca cga gag tac agc gtg gag gcc gag gaa agg
 Tyr His Pro Thr Val Pro Leu Ala Arg Glu Tyr Ser Val Glu Ala Glu Glu Arg
 200 205 210 215

atc ggc agg ccg gtg cat gag ttt atg ctg aag ccg ggt gat ttg ttg tac ttt
 Ile Gly Arg Pro Val His Glu Phe Met Leu Lys Pro Gly Asp Leu Leu Tyr Phe
 220 225 230

ccc aga gga acc att cat caa gcg gac act cct gcg ggg ctg gcc cac tcg act
 Pro Arg Gly Thr Ile His Gln Ala Asp Thr Pro Ala Gly Leu Ala His Ser Thr
 235 240 245 250

cac gtg acc atc agc acc tac cag aac aat tca tgg gga gat ttc ctt ttg gat
 His Val Thr Ile Ser Thr Tyr Gln Asn Asn Ser Trp Gly Asp Phe Leu Leu Asp
 255 260 265 270

acc atc tcg ggg ctt gta ttt gat act gca aag gaa gac gtg gag tta cgg acc
 Thr Ile Ser Gly Leu Val Phe Asp Thr Ala Lys Glu Asp Val Glu Leu Arg Thr
 275 280 285

ggc ata ccc cgg cag ctg ctc ctg gtg gaa tcc aca act gtt gct aca aga cga
 Gly Ile Pro Arg Gln Leu Leu Leu Val Glu Ser Thr Thr Val Ala Thr Arg Arg
 290 295 300 305

tta agt ggc ttc ctg agg aca ctt gca gac cgg ctg gag ggc acc aaa gaa ctg
 Leu Ser Gly Phe Leu Arg Thr Leu Ala Asp Arg Leu Glu Gly Thr Lys Glu Leu
 310 315 320

ctt tcc tca gac atg aag aag gat ttt att atg cac aga ctc ccc cct tac tct
 Leu Ser Ser Asp Met Lys Lys Asp Phe Ile Met His Arg Leu Pro Pro Tyr Ser
 325 330 335 340

gcg gga gat ggg gca gag ctg tca aca oca ggt gga aag tta ccg agg ctg gac
 Ala Gly Asp Gly Ala Glu Leu Ser Thr Pro Gly Gly Lys Leu Pro Arg Leu Asp
 345 350 355 360

10

20

30

40

agt gta gtg aga ctg cag ttt aaa gac cac att gtc ctc aca gta ctg ccg gat
 Ser Val Val Arg Leu Gln Phe Lys Asp His Ile Val Leu Thr Val Leu Pro Asp
 365 370 375

caa gat caa tct gat gaa gct caa gaa aag atg gtg tac atc tat cat tcc tta
 Gln Asp Gln Ser Asp Glu Ala Gln Glu Lys Met Val Tyr Ile Tyr His Ser Leu
 380 385 390 395

aag aat agt aga gag aca cac atg atg gga aat gag gag gaa aca gag ttt cat
 Lys Asn Ser Arg Glu Thr His Met Met Gly Asn Glu Glu Glu Thr Glu Phe His
 400 405 410

gga ctt cgc ttc cct ttg tca cat ttg gat gca ctg aag caa att tgg aat agt
 Gly Leu Arg Phe Pro Leu Ser His Leu Asp Ala Leu Lys Gln Ile Trp Asn Ser
 415 420 425 430

cca gct att tct gtc aag gac ctg aaa ctt act aca gat gag gaa aag gaa agc
 Pro Ala Ile Ser Val Lys Asp Leu Lys Leu Thr Thr Asp Glu Glu Lys Glu Ser
 435 440 445 450

ctg gta tta tcc ctc tgg aca gaa tgt tta att caa gta gtc tag
 Leu Val Leu Ser Leu Trp Thr Glu Cys Leu Ile Gln Val Val ***
 455 460 464

<210> 2

<211> 465

<212> DNA

<213> Mus musculus

<400> 2

atg cca aag aaa gtg cag ccc aca ggg gat gag aac gaa gaa gag tct gtt cct
 Met Pro Lys Lys Val Gln Pro Thr Gly Asp Glu Asn Glu Glu Glu Ser Val Pro
 5 10 15

tgc aag cgg gtg aag gag gag ctg cct gaa acg ctt tct gta tta aac ttt gac
 Cys Lys Arg Val Lys Glu Glu Leu Pro Glu Thr Leu Ser Val Leu Asn Phe Asp
 20 25 30 35

agc ccc agt agt ttc ttc gaa agt tta atc tca ccc atc aaa gta gag act ttt
 Ser Pro Ser Ser Phe Phe Glu Ser Leu Ile Ser Pro Ile Lys Val Glu Thr Phe
 40 45 50

ttc aag gaa ttc tgg gaa caa aag ccc ctt ctc att cag agg gat gac cct gta
 Phe Lys Glu Phe Trp Glu Gln Lys Pro Leu Leu Ile Gln Arg Asp Asp Pro Val
 55 60 65 70

ctg gcc aaa tat tac cag tct ctg ttc agc ctc tca gat ctg aag aga ctc tgc
 Leu Ala Lys Tyr Tyr Gln Ser Leu Phe Ser Leu Ser Asp Leu Lys Arg Leu Cys

10

20

30

40

75	80	85	90
aag aaa gga gtg tac tat gga aga gac gtg aat gtc tgc cgg agc atc agt ggg			
Lys Lys Gly Val Tyr Tyr Gly Arg Asp Val Asn Val Cys Arg Ser Ile Ser Gly			
95	100	105	
aag aag aag gtt tta aat aag gat ggc aga gca cat ttt ctt cag ctg aga aaa			
Lys Lys Lys Val Leu Asn Lys Asp Gly Arg Ala His Phe Leu Gln Leu Arg Lys			
110	115	120	125
gat ttt gat cag aag agg gca aca att cag ttt cac·caa cct cag aga tat aag			
Asp Phe Asp Gln Lys Arg Ala Thr Ile Gln Phe His Gln Pro Gln Arg Tyr Lys			
130	135	140	
gat gag ctg tgg cgg atc cag gaa aag ctg gaa tgt tac ttt ggg tcc tta gta			
Asp Glu Leu Trp Arg Ile Gln Glu Lys Leu Glu Cys Tyr Phe Gly Ser Leu Val			
145	150	155	160
ggc tcg aat gtg tac atg act cct gca gga tct cag ggc ctc cct cca cat tat			
Gly Ser Asn Val Tyr Met Thr Pro Ala Gly Ser Gln Gly Leu Pro Pro His Tyr			
165	170	175	180
gat gat gtt gag gtt ttt atc ctg cag ctg gag gga acg aaa cac tgg cgc ctg			
Asp Asp Val Glu Val Phe Ile Leu Gln Leu Glu Gly Thr Lys His Trp Arg Leu			
185	190	195	
tac tcc cca act gtg ccc ctg gca cac gag tac agt gtg gaa tct gag gac cgg			
Tyr Ser Pro Thr Val Pro Leu Ala His Glu Tyr Ser Val Glu Ser Glu Asp Arg			
200	205	210	215
atc ggc aca ccg aca cac gac ttc ctg ctg aag cct gga gat ttg ttg tac ttt			
Ile Gly Thr Pro Thr His Asp Phe Leu Leu Lys Pro Gly Asp Leu Leu Tyr Phe			
220	225	230	
ccc aga ggg acc att cat cag gca gaa act cct tca ggc ctg gcc tac tct att			
Pro Arg Gly Thr Ile His Gln Ala Glu Thr Pro Ser Gly Leu Ala Tyr Ser Ile			
235	240	245	250
cac ctg act att agc acc tac cag aac aat tca tgg gga gac tgc ctt ttg gat			
His Leu Thr Ile Ser Thr Tyr Gln Asn Asn Ser Trp Gly Asp Cys Leu Leu Asp			
255	260	265	270
tcc att tcg ggg ttc gta tti gac att gca aag gaa gat gtg gca tta agg agt			
Ser Ile Ser Gly Phe Val Phe Asp Ile Ala Lys Glu Asp Val Ala Leu Arg Ser			
275	280	285	
gga atg ccc cgg cgg atg ctc ctg aat gtg gaa acc cca gct gat gta aca agg			
Gly Met Pro Arg Arg Met Leu Leu Asn Val Glu Thr Pro Ala Asp Val Thr Arg			
290	295	300	305
aag ttg agt ggc ttt ctg agg act ctt gca gac cag ctc gag ggc aga gaa gag			
Lys Leu Ser Gly Phe Leu Arg Thr Leu Ala Asp Gln Leu Glu Gly Arg Glu Glu			

10

20

30

40

310	315	320	
ctg ctg tca tca gat atg aag aag gac ttc gtc aag cac aga ctc cct cct ttc			
Leu Leu Ser Ser Asp Met Lys Lys Asp Phe Val Lys His Arg Leu Pro Pro Phe			
325	330	335	340
ttc gag gga aat gga acg gag acg atg gac cca ggt aaa cag ttg cca agg ttg			
Phe Glu Gly Asn Gly Thr Glu Thr Met Asp Pro Gly Lys Gln Leu Pro Arg Leu			
345	350	355	360
gac aac ata ata aga ctg cag ttc aaa gat cac att gtc ctc aca gta ggg cca			
Asp Asn Ile Ile Arg Leu Gln Phe Lys Asp His Ile Val Leu Thr Val Gly Pro			
365	370	375	
gat aag aat cca ttt gat gaa gct caa caa aag gtg gtt tac atc tat cat tct			
Asp Lys Asn Pro Phe Asp Glu Ala Gln Gln Lys Val Val Tyr Ile Tyr His Ser			
380	385	390	395
ctg aag aat gtg agg cag atg cac atg ata gga gaa gag gag gaa tcc gag att			
Leu Lys Asn Val Arg Gln Met His Met Ile Gly Glu Glu Glu Glu Ser Glu Ile			
400	405	410	
ttc ggt ctt cgc ttt cct tta tca cat gtg gat gct ctg aag caa atc tgg tgc			
Phe Gly Leu Arg Phe Pro Leu Ser His Val Asp Ala Leu Lys Gln Ile Trp Cys			
415	420	425	430
ggg tca cca att cgt gtt aag gaa ctg aaa ctt gac aca gat gaa gaa aag gag			
Gly Ser Pro Ile Arg Val Lys Glu Leu Lys Leu Asp Thr Asp Glu Glu Lys Glu			
435	440	445	450
aac ctg gca ctg tct ctc tgg tcg gag tct tta atc caa gta ctc tag			
Asn Leu Ala Leu Ser Leu Trp Ser Glu Ser Leu Ile Gln Val Leu ***			
455	460	465	
<210> 3			
<211> 475			
<212> DNA			
<213> Rattus norvegicus			
<400> 3			
atg cca aag aaa gtg aag ccc aca ggg gat gag aat gaa gaa gag tct gtt cct			
Met Pro Lys Lys Val Lys Pro Thr Gly Asp Glu Asn Glu Glu Glu Ser Val Pro			
5	10	15	
tgc aag cag gtg aaa gag gag cta cct aat acg ctt tct gta tta aac ttt gac			
Cys Lys Gln Val Lys Glu Glu Leu Pro Asn Thr Leu Ser Val Leu Asn Phe Asp			
20	25	30	35
agc ccc agt agt ttc ttt gaa agt tta ata tca ccc atc aaa gta gag aca ttt			

10

20

30

40

Ser Pro Ser Ser Phe Phe Glu Ser Leu Ile Ser Pro Ile Lys Val Glu Thr Phe
 40 45 50
 ttc aag gaa ttc tgg gaa cag aag ccc ctt ctc att cag aga gat gac cct tcg
 Phe Lys Glu Phe Trp Glu Gln Lys Pro Leu Leu Ile Gln Arg Asp Asp Pro Ser
 55 60 65 70
 ctg gcc gca tat tac cag tct ctg ttc agc ctc tca gat ctg agg aqt ctc tgc
 Leu Ala Ala Tyr Tyr Gln Ser Leu Phe Ser Leu Ser Asp Leu Arg Ser Leu Cys
 75 80 85 90
 agc caa ggg ctg tac tat gga aga gat gtc aat gtc tgc cgg tgc atc ggt ggg
 Ser Gln Gly Leu Tyr Tyr Gly Arg Asp Val Asn Val Cys Arg Cys Ile Gly Gly
 95 100 105
 aag aag aag gtt tta aat aag gat ggc aaa gca cag ttt ctt cag ctg aga aaa
 Lys Lys Lys Val Leu Asn Lys Asp Gly Lys Ala Gln Phe Leu Gln Leu Arg Lys
 110 115 120 125
 gat ttt gat cag aag agg gca aca att cag ttt cat cag cca cag aga ttt aag
 Asp Phe Asp Gln Lys Arg Ala Thr Ile Gln Phe His Gln Pro Gln Arg Phe Lys
 130 135 140
 gat gag ctc tgg agg atc cag gaa aag ctg gaa tgt tac ttt ggc tcc tta gta
 Asp Glu Leu Trp Arg Ile Gln Glu Lys Leu Glu Cys Tyr Phe Gly Ser Leu Val
 145 150 155 160
 ggc tca aat gtg tac atg act ccc gca gga tct cag ggc ctt cct cca cat tac
 Gly Ser Asn Val Tyr Met Thr Pro Ala Gly Ser Gln Gly Leu Pro Pro His Tyr
 165 170 175 180
 gac gat gtt gag gtt ttt atc ctg cag ctg gag gga agg aaa cgt tgg cgc ctg
 Asp Asp Val Glu Val Phe Ile Leu Gln Leu Glu Gly Arg Lys Arg Trp Arg Leu
 185 190 195
 tac tcc cca act gtg ccc ctg gcg cgt gag tac agt gtg gag cct gag gac cgg
 Tyr Ser Pro Thr Val Pro Leu Ala Arg Glu Tyr Ser Val Glu Pro Glu Asp Arg
 200 205 210 215
 att ggc aca cca aca cat gac ttc ctg ctg aag cct ggc gat ttg ttg tac ttc
 Ile Gly Thr Pro Thr His Asp Phe Leu Leu Lys Pro Gly Asp Leu Leu Tyr Phe
 220 225 230
 ccc aga ggg acc att cac cag gca gaa act cct tca ggc ctg gcc cac tct att
 Pro Arg Gly Thr Ile His Gln Ala Glu Thr Pro Ser Gly Leu Ala His Ser Ile
 235 240 245 250
 cac ctg act att agc acc tac cag aac aat tca tgg gga gat tac ctt ttg gac
 His Leu Thr Ile Ser Thr Tyr Gln Asn Asn Ser Trp Gly Asp Tyr Leu Leu Asp
 255 260 265 270
 tcc att tcg ggg ctt gta ttt gac att gca aag gaa gat gtg gca tta agg act
 40

10

20

30

40

```

Ser Ile Ser Gly Leu Val Phe Asp Ile Ala Lys Glu Asp Val Ala Leu Arg Thr
      275                      280                      285

gga atg ccc agg cgg atg ctc atg aat gtg gaa acc cca gct gac gta  aca agg
Gly Met Pro Arg Arg Met Leu Met Asn Val Glu Thr Pro Ala Asp Val  Thr Arg
      290                      295                      300                      305

aag ttg agt ggc ttt ctg agg act ctg gca gac cag ctc gag ggc aga  aaa gaa
Lys Leu Ser Gly Phe Leu Arg Thr Leu Ala Asp Gln Leu Glu Gly Arg  Lys Glu
      310                      315                      320

ctg ctc tca tca gat atg aag aag gac ttc gtc atg cac aga ctt ccc  cct ttc
Leu Leu Ser Ser Asp Met Lys Lys Asp Phe Val Met His Arg Leu Pro  Pro Phe
      325                      330                      335                      340

tgt gtg gga aat gga aca gag tca atg aac cca ggt gga aag ttg cca  agg ttg
Cys Val Gly Asn Gly Thr Glu Ser Met Asn Pro Gly Gly Lys Leu Pro  Arg Leu
      345                      350                      355                      360

aac agc ata gta aga ctg cag ttt aaa gac cac att gtc ctc aca gta  ggg ccc
Asn Ser Ile Val Arg Leu Gln Phe Lys Asp His Ile Val Leu Thr Val  Gly Pro
      365                      370                      375

gat cag aat caa tct gat gaa gct caa caa aag gtg gtt tac atc tac  cat tct
Asp Gln Asn Gln Ser Asp Glu Ala Gln Gln Lys Val Val Tyr Ile Tyr  His Ser
      380                      385                      390                      395

cta aag aat gag aga cag acg cac atg atg ggg aaa gag gtg gaa aca  gag att
Leu Lys Asn Glu Arg Gln Thr His Met Met Gly Lys Glu Val Glu Thr  Glu Ile
      400                      405                      410

tat gga ctt cgc ttt cct tta tcc tat gtg gac gct ctg aag caa atc  tgg tgc
Tyr Gly Leu Arg Phe Pro Leu Ser Tyr Val Asp Ala Leu Lys Gln Ile  Trp Cys
      415                      420                      425                      430

ggg tca cca gtt cgt gtt aag gac ctg aaa ctt ggc aca gat gaa gag  aag gag
Gly Ser Pro Val Arg Val Lys Asp Leu Lys Leu Gly Thr Asp Glu Glu  Lys Glu
      435                      440                      445                      450

aac ctg gca gtg tct ctc tgg aca gag tgt cta gtc cac gtg ctc tag
Asn Leu Ala Val Ser Leu Trp Thr Glu Cys Leu Val His Val Leu ***
      455                      460                      465

```

10

20

30

B

【 4 】

【 5 】

B

【 6 】

【 7 】

【 8 】

【 9 】

【 1 2 】
A, Mina53と食道癌累積生存率との関係

B, Ki-67と食道癌累積生存率との関係

フロントページの続き

(51) Int.Cl.		F I		
G 0 1 N 33/574 (2006.01)		G 0 1 N 33/574		A
G 0 1 N 33/577 (2006.01)		G 0 1 N 33/574		D
C 1 2 P 21/08 (2006.01)		G 0 1 N 33/577		B
		C 1 2 P 21/08		

(56) 参考文献 欧州特許出願公開第 0 1 0 7 4 6 1 7 (E P , A 1)
Anal Biochem. , 2 0 0 2 年 3 月 1 日 , Vol.302, No.1, , p.38-51.

(58) 調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
C12N 15/00-90 ZNA
C07K 14/82
C07K 16/32
EUROPAT(QUESTEL)
BIOSIS/WPI(DIALOG)
MEDLINE(STN)
SwissProt/PIR/GeneSeq
GenBank/EMBL/DDBJ/GeneSeq
JSTPlus(JOIS)